

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1910

THÈSE

N°

279

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

PAR

Madame LIBIN

(née Pauline LAPIDOUSSON)

Née à Janicky (Russie), le 25 Décembre 1884.

DE

L'AVENIR DES FEMMES

Ayant eu des Pleurésies avant ou après la puberté

ET DEVENANT MÈRES

Président : M. PINARD, professeur.

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUVE & C^{ie} Editeurs

15, Rue Racine, 15

1910

11-11-11

279

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1910

THÈSE

N° —

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

PAR

Madame LIBIN

(née Pauline LAPIDOUSSON)


Née à Janicky (Russie), le 25 Décembre 1884.

DE

L'AVENIR DES FEMMES

Ayant eu des Pleurésies avant ou après la puberté

ET DEVENANT MÈRES



Président: M. PINARD, professeur.

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUVE & C^{ie} Editeurs

15, Rue Racine, 15

—
1910

Faculté de Médecine de Paris

LE DOYEN	M. LANDOUZY
PROFESSEURS	MM.
Anatomie.	NICOLAS
Physiologie.	CH. RICHET
Physique médicale.	GARIEL
Chimie organique et Chimie générale.	GAUTIER
Parasitologie et Histoire naturelle médicale.	BLANCHARD
Pathologie et Thérapeutique générales.	ACHARD
Pathologie médicale.	WIDAL
Pathologie chirurgicale.	DEJERINE
Anatomie pathologique.	LANNELONGUE
Histologie.	PIERRE MARIE
Opérations et appareils.	PRENANT
Pharmacologie et matière médicale.	HARTMANN
Thérapeutique	POUCHET
Hygiène.	GILBERT
Médecine légale.	CHANTEMESSE
Histoire de la médecine et de la chirurgie.	THOINOT
Pathologie expérimentale et comparée.	CHAUFFARD
	ROGER
	HAYEM
Clinique médicale.	DIEULAFOY
	DEBOVE
	LANDOUZY
	HUTINEL
Maladies des enfants.	
Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale	GILBERT BALLE
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.	GAUCHER
Clinique des maladies du système nerveux	RAYMOND
	DELBET
Clinique chirurgicale.	QUENU
	RECLUS
	SEGOND
Clinique ophtalmologique.	DE LAPERSONNE
Clinique des maladies des voies urinaires.	ALBARRAN
	BAR
Clinique d'accouchements	PINARD
	RIBEMONT-DESSAIGNES
Clinique gynécologique.	POZZI
Clinique chirurgicale infantile.	KIRMISSON
Clinique thérapeutique.	ALBERT ROBIN

Agrévés en exercice

MM.			
AUVRAY	CUNEO	LAUNOIS	NOBECOURT
BALTHAZARD	DEMEIN	LECENE	OMBREDANNE
BRANCA	DESGREZ	LEGRY	POTOCKI
BEZANCON (F.)	DUVAL (P.)	LENORMANT	PROUST
BRINDEAU	GOSSET	LOFFER	RENON
BROCA (A.)	GOUGET	MACAIGNE	RICHAUD
BRUMPT	JEANNIN	MAILLARD	RIEFFEL
CARNOT	JEANSEIME	MARION	SICARD
CASTAIGNE	JOUSSET (A.)	MORESTIN	ZIMMERN
CLAUDE	LABBE (M.)	MULON	
COUVELAIRE	LANGLOIS	NICLOUX	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MON PÈRE

A MON MARI

A MA FILLE VITIA

A MON MAÎTRE ET PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR PINARD

Membre de l'Académie de Médecine

A MES AUTRES MAITRES

Qu'il me soit permis de les remercier de la bienveillance avec laquelle ils ont suivi les étapes de mes études médicales, et d'exprimer toute ma gratitude à MM. les professeurs Deboye, Pozzi, Quénu, MM. les professeurs agrégés Renon, Wallich, Couvelaire et MM. Mouchotte, ancien chef de clinique, Lacase, chef de clinique, qui ont bien voulu me faire profiter de leur expérience et m'aider de leurs conseils.

DE L'AVENIR DES FEMMES

Ayant eu des pleurésies

AVANT OU APRÈS LA PUBERTÉ ET DEVENANT MÈRES

AVANT-PROPOS

¹^e Nous croirions manquer à un devoir si au début de cette thèse inaugurale nous ne commençons pas par remercier le professeur Pinard à qui nous sommes redevable de nos modestes connaissances dans l'art si difficile des accouchements. Nous garderons toujours gravé dans notre mémoire le souvenir de ces entretiens du matin où le maître distribue à ses élèves « le pain quotidien » comme il se plaît lui-même à nommer les enseignements pratiques, grâce auxquels un accoucheur ne doit jamais se trouver embarrassé quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve placé.

Combien de fois ne l'avons-nous pas entendu s'écrier, après avoir entendu de la bouche d'un de ses élèves l'exposé de l'observation d'une femme primipare ou multipare, présentant dans ses antécédents pathologiques une pleurésie de date plus ou moins récente et ayant accouché d'un superbe enfant à terme : « Eh bien ! Messieurs, redouterez-vous maintenant la grossesse chez une femme qui a eu une pleurésie ? »

C'est imbue de ces idées que nous avons recherché dans la littérature obstétricale, quels étaient les auteurs qui s'étaient occupés de cette question.

Nous n'avons trouvé que fort peu de choses. Rien dans les classiques qui n'ont traité que de l'évolution de la pleurésie chez une femme enceinte et de son influence sur le développement de l'œuf.

Ce que nous avons trouvé encore, ce sont d'innombrables discussions sur la nature de la pleurésie : tuberculeuse ou non tuberculeuse. Sans vouloir prendre parti dans cette discussion, nous sommes cependant obligée de constater que, si la pleurésie est toujours de nature tuberculeuse, c'est au moins une forme atténuée de tuberculose, car dans les observations que nous présentons, sur 239 femmes ayant eu une pleurésie à une époque quelconque de leur existence (80 primipares et 159 multipares) nous n'en trouvons que 40 (15 primipares et 25 multipares) qui présentent aux poumons des lésions bacillaires nettes au moment de leur passage dans le service, soit 17 0/0 environ.

Une question qui a été fort souvent agitée aussi et résolue de façon différente suivant les auteurs, c'est celle des rapports de la tuberculose et de la puerpéralité. Nous ne nous étendrons pas longtemps sur ce sujet qui n'a pas de rapports directs avec notre thèse, et nous nous contenterons de montrer le chemin parcouru depuis P. Dubois qui disait : « Si une femme menacée de tuberculose se marie, elle pourra bien résister à un premier accouchement, difficilement à un second, jamais à un troisième » jusqu'à la thèse de Kanica (Paris, 1903) et celle de Monnier (Paris, 1908), faites sous la direction du professeur Pinard qui avait déjà défendu ces idées au Congrès de Rome (1902), thèses qui montrent, statistiques en mains, qu'une femme non seulement menacée de tuberculose, mais même ayant déjà des lésions aisément perceptibles à l'auscultation peut, le plus souvent, parfaitement mener à bien un nombre parfois considérable de grossesses sans danger pour elle ni pour son produit de conception.

Ce que nous retiendrons encore de nos recherches, c'est une phrase de E. Bonnaire tirée d'un article paru dans la *Presse Médicale* le 6 octobre 1905 : « Tarnier enseigne que le mariage doit être interdit à toute prédisposée héréditaire ayant eu des bronchites répétées avec hémoptysies. En partageant l'avis de notre maître, nous ajouterons la pleurésie à ces manifestations prohibitives. » Voyons ce que nous devons penser en nous appuyant sur la statistique de cet anathème lancé contre les prédisposées héréditaires à la tuberculose ayant eu une pleurésie et de leur condamnation sans appel au célibat.

Il semble au premier abord, avec ce que nous savons déjà, que cette assertion soit au moins exagérée, car on ne comprend pas facilement que cette grossesse qui ordinairement n'aura pas d'influence néfaste sur une tuberculose déclarée, soit susceptible d'en faire éclater une chez une prédisposée.

Mais rien ne vaut la puissance démonstrative du chiffre. Si du bloc de nos observations nous extrayons celles de femmes qui aggravent leurs cas d'antécédents héréditaires tuberculeux (père, mère, frères ou sœurs morts bacillaires), nous trouvons un ensemble de quarante femmes (10 primipares et 30 multipares) venant expulser à la clinique un premier, une deuxième, un troisième, un dixième et même un dix-septième produit de conception, nous n'avons à enregistrer qu'un seul désastre : II-pare morte de tuberculose pulmonaire trois jours après son accouchement (Obs. 205. Clinique Baude-locque, 1907, obs. 1838).^d Et encore chez cette femme nous trouvons simplement dans l'observation au casier de ses antécédents héréditaires : père mort à soixante-dix ans d'affection pulmonaire, sans que nous puissions préciser s c'était vraiment de la tuberculose.

Parmi les autres 39 nous relevons seulement 7 fois (2 primipares et 5 multipares) des lésions tuberculeuses du poumon, soit 17 0/0, c'est-à-dire exactement la même proportion que pour les femmes qui n'ont pas de prédispositions héréditaires.

Avant de passer à l'énumération des observations, nous tiendrions à retenir particulièrement l'attention sur

quelques-unes d'entre elles qui nous paraissent présenter un intérêt tout spécial.

C'est d'abord l'observation 138 (Baudelocque, 1903, obs. 614) qui nous expose l'histoire d'une femme qui, à trente-neuf ans, enceinte pour la septième fois vient expulser à la clinique son produit de conception. Dans ces antécédents héréditaires nous ne trouvons rien d'intéressant, mais dans son casier pathologique nous trouvons qu'elle a eu à vingt ans, en 1884, outre une pleurésie un rhumatisme articulaire qui lui a laissé une lésion mitrale.

Or, de 1891 à 1903 elle a eu huit enfants. Nous n'avons pas le poids du premier car la femme a accouché chez elle ; mais à partir de ce moment nous avons les renseignements les plus complets. En 1893 elle a un enfant de 3.720 grammes. En 1894 un de 3.750. En 1896 un quatrième de 3.500 grammes. En 1898 avortement au cours du troisième mois (cause inconnue). En 1900 nouvelle grossesse, enfant de 4.090 grammes. Enfin en 1903 elle fait mieux encore puisque son produit de conception pèse 4.240 grammes avec un placenta de 560 grammes. Or tous les enfants sont vivants quoique ayant été élevés au biberon les uns par une nourrice, les autres par la mère.

Nous ajouterons que ses suites de couches ont été normales comme ses grossesses et qu'on n'a jamais constaté aucun trouble du côté des poumons.

Une autre observation bien intéressante est celle de cette femme qui arrive à la clinique le 22 avril 1909 (obs. 233) (Cl. Baudelocque, 1909, obs. 670) enceinte pour la dix-septième fois. Or, elle a eu sa pleurésie en 1894

entre sa huitième et sa neuvième grossesse, ce qui nous permettra de voir s'il y a une différence entre les puerpéralités antérieures à cet accident et celles qui l'ont suivi. Or de huit grossesses qu'elle a eues avant 1894, deux se sont terminées par des avortements et six par des accouchements à terme ou près du terme et sur ces 6 enfants deux seulement sont vivants, 4 étant morts en bas âge. Depuis 1894 elle a été enceinte 9 fois. Encore 2 avortements et 6 grossesses à terme ou près du terme. De ces 6 enfants 4 sont vivants et 2 sont morts, l'un à dix-huit mois dans une crèche et un autre à deux ans de fièvre typhoïde. Sa dix-septième et dernière grossesse, celle que nous avons pu observer à la clinique, s'est terminée par un accouchement prématuré (enfant de 3.080 gr.) mais qui s'explique fort bien par l'insertion basse du placenta (mensuration des membranes 22/3). Suites de couches normales. Rien aux poumons.

Voilà maintenant des femmes qui présentent des antécédents héréditaires tuberculeux très nets. Voyez l'observation 95 (Cl. Baudelocque, 1900, obs. 2112). Aux antécédents héréditaires on trouve que le père est mort tuberculeux ; au casier pathologique pleurésie à deux ans. La femme a toujours toussé et craché du sang à plusieurs reprises. Or, elle arrive à la clinique le 8 novembre 1900, enceinte pour la quatorzième fois, son état général est bon. Dans son passé obstétrical on relève un avortement gémellaire au cours du deuxième mois et douze accouchements à terme ou près du terme. Sur les 12 enfants 8 sont

vivants et bien portants, 4 sont morts en bas âge (ils étaient tous nourris par une nourrice).

La dernière grossesse se termine par l'expulsion au cours du neuvième mois d'un enfant de 3.300 grammes. (Le placenta était inséré à 0). Suites de couches, normales.

Enfin, voilà une histoire qui répond éloquemment à ceux qui voudraient interdire le mariage aux prédisposées héréditaires ayant eu une pleurésie. La femme dont il s'agit observation 88 (Cl. Baudelocque, 1901, obs. 98) est issue d'une mère tuberculeuse. Elle a eu à neuf ans une fluxion de poitrine et à dix-sept ans une pleurésie gauche. A ce moment elle avait déjà eu un enfant mort trois jours après sa naissance (application de forceps). Depuis cette époque elle a été enceinte 9 fois. Sur les 8 enfants qu'elle a eus chez elle, elle en a allaité 7. Un seul a été élevé au biberon, ils sont tous vivants et bien portants. Enfin son dixième accouchement se passe à Baudelocque. Elle donne le jour à un enfant de 4.010 grammes qui quitte la clinique le huitième jour en parfait état, ainsi que sa mère qui a eu des suites de couches tout à fait normales. A aucun moment on n'a trouvé quoi que ce soit d'inquiétant du côté des poumons.

Et maintenant voici toutes les observations que nous avons pu recueillir dans les Archives de la Clinique Baudelocque pendant dix ans de fonctionnement de 1900 à 1910. Nous espérons qu'elles seront assez persuasives pour convaincre les praticiens qu'ils n'ont pas le droit de priver des joies de maternité les femmes qui ont eu une pleurésie à un moment quelconque de leur existence et même celles qui aggravent leur cas d'une hérédité tuberculeuse.

CLINIQUE BAUDELOCQUE

OBSERVATIONS 1900-1910

Primipares

OBSERVATION I (Obs. 197, 31 janvier 1900).

Femme F. J..., vingt et un ans, journalière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort d'une fluxion de poitrine.

Réglée à quinze ans et demi, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

Actuellement rien aux poumons.

Dernières règles : du 15 au 20 avril.

Accouchement normal.

Enfant pesant 4.080 grammes à sa naissance et 4.220 gr. à sa sortie le huitième jour. Placenta 680 grammes. Membranes : 26/6.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant

OBSERVATION II (Obs. 616. Avril 1900).

K. B..., trente-six ans, I-pare, femme de chambre.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie droite à vingt-huit ans, soignée à Lariboisière.

Réglée à quatorze ans, régulièrement.

Dernières règles : du 4 au 9 juin.

Etat général de la femme, satisfaisant.

Application de forceps pour défaut de progression de la tête.

Enfant pesant 3.410 grammes à sa naissance et 3.970 gr. à sa sortie le trentième jour. Délivrance artificielle. Placenta 570 grammes.

Suites de couches. La température oscille entre 38°4 et 37 degrés. Le pouls entre 140 et 84 les quinze premiers jours. Le quinzième jour la température et le pouls deviennent normaux et restent tels jusqu'à la sortie de la femme le trente et unième jour. Elle sort dans un état général bon.

OBSERVATION III (Obs. 1183, 26 juin 1900).

Femme P. A..., vingt ans, cuisinière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quatre ans.

Réglée ?

Dernières règles : du 14 au 17 septembre.

Rien aux poumons.

Des petites hémorragies pendant la grossesse.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.120 grammes à sa naissance et 2.870 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 520 grammes. Membranes : 29/10.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION IV (Obs. 1469, 6 août 1900).

Femme C. S..., vingt et un ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

Rougeole à dix ans.

Réglée à douze ans régulièrement.

Dernières règles : du 28 octobre au 1^{er} novembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.010 grammes à sa naissance et 3.280 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 34/8.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant,

OBSERVATION V (Obs. 41, 7 janvier 1901).

Femme E. B... vingt-six ans, blanchisseuse, I-paré.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-trois ans.

Réglée à onze ans.

Dernières règles : du 14 au 17 mai (?)

Rien aux poumons.

Accouchement normal.

Enfant pesant 3.020 grammes à sa naissance et 2.930 gr.
à sa sortie le neuvième jour. Placenta 450 grammes. Membranes
déchirées. Mensuration impossible.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION VI (Obs. 65, 16 janvier 1901).

Femme M. E..., vingt-sept ans, couturière, I-paré.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Rougeole, scarlatine dans
l'enfance.

Pleurésie gauche à quinze ans.

Réglée à douze ans.

Dernières règles : du 19 au 26 mai.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa
grossesse. Elle a eu une hémorragie qui a duré trois jours.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané dans le cours du huitième mois.

Enfant pesant 2.000 grammes à sa naissance, mort cinq jours
après.

Placenta 370 grammes. Membranes 24/14.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour bon.

OBSERVATION VII (Obs. 217, 2 février 1901).

Femme M. P..., dix-neuf ans, couturière, I-paré.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Bronchite à douze ans, pleurésie
à onze ans.

Dernières règles : du 20 au 25 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant mort pesant 2.580 grammes. (Procubitus du cordon). Placenta 690 grammes. Membranes 29/9.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le cinquième jour, bon.

OBSERVATION VIII (Obs. 226, 4 février 1901).

Femme, D. R..., dix-huit ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort alcoolique.

Antécédents personnels. — Coqueluche dans l'enfance.

Pleurésie à onze ans et à seize ans.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Dernières règles : du 13 au 16 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.230 grammes, parti en nourrice le deuxième jour.

Placenta 430 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le septième jour, satisfaisant.

OBSERVATION IX (Obs. 780, 13 mars 1901).

Femme, D. N..., vingt-deux ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte de péritonite.

Antécédents personnels. — Pleurésie à huit ans.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Dernières règles : du 4 juillet. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Rien au poumons.

Accouchement au neuvième mois. Enfant pesant 2.850 gr. à sa naissance et 2.700 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 450 grammes.

Mensuration des membres impossible.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION X (Obs. 1219, 17 juillet 1901).

Femme C. M..., âgée de vingt-huit ans, domestique, I-pare.

Porteuse de pain.

Antécédents héréditaires. — Père mort asthmatique.

Frères et sœurs sujets aux bronchites.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Pleurésie droite à onze ans. Croup. Trachéotomie.

Hémoptysies à l'époque de ses règles. Tousse pendant l'hiver.

Dernières règles : du 11 au 18 mars.

Pendant sa grossesse, quelques hémoptysies le matin.

Céphalée et troubles oculaires.

Au moment de l'accouchement, très léger nuage d'albumine.

Etat général : aux poumons, on trouve du côté droit, respiration faible, quelques frottements pleuraux.

La grossesse est de cinq mois, l'expulsion du produit de conception est provoquée par une chute dans l'escalier d'après la femme.

OBSERVATION XI (Obs. 1476).

Femme G. P..., vingt-quatre ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à trente-six ans tuberculeux.

Réglée à quatorze ans.

Antécédents personnels. — Absès froids à deux ans.

Pleurésie à vingt et un ans en 1898.

Dernières règles du 30 novembre au 2 décembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de la grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.590 grammes à sa naissance et 2.620 grammes à sa sortie le huitième jour.

Placenta 370 grammes. Membranes 37/4.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XII (Obs. 1669, 22 septembre 1901).

Femme L. A..., vingt-quatre ans, femme de ménage, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie gauche à douze ans.

Réglée à vingt ans irrégulièrement.

Dernières règles : du 8 ou 10 novembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.550 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le dixième jour.

Placenta 500 grammes. Membranes 27/13.

Suites de couches. Elévation de température au septième jour à 38°9 et le pouls 120, causée par une lymphangite du sein droit.

Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XIII (Obs. 2017, 8 novembre 1901).

Femme B. A..., vingt-trois ans, journalière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort tuberculeux.

Antécédents personnels. — Bronchite à quatorze ans, pleurésie à dix-huit ans en 1896.

Réglée à quatorze ans.

Dernières règles : du 28 janvier au 4 février.

Etat général satisfaisant. Température et pouls normaux. Aux poumons, on trouve au sommet droit en avant : respiration rude, exagération des vibrations thoraciques.

Accouchement spontané (présentation du siège). Enfant pesant 2.510 grammes à sa naissance et 2.600 grammes à sa sortie le onzième jour.

Placenta 440 grammes. Membranes 25/12.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION XIV (Obs. 2206, 10 décembre 1901).

Femme C. G..., vingt-deux ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à treize ans.

Réglée à treize ans régulièrement.

Dernières règles : du 7 au 11 mars.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.800 grammes à sa naissance et 3.570 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 580. Membranes 38/13.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION XV (Obs. 53), janvier 1902.

Femme P. L..., vingt-neuf ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à treize ans.

Réglée à vingt ans irrégulièrement.

Dernières règles : du 27 mars au 2 avril.

Dernier rapport sexuel il y a quatre jours.

Rien aux poumons.

Stigmates de rachitisme : tibias incurvés, bosses frontales saillantes.

Expulsion d'un fœtus mort pesant 2.780 grammes.

Placenta 40 grammes. Membranes 27/6.

La mort de l'enfant s'explique par la compression du cordon.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XVI (Obs. 183, 5 février 1902).

Femme F. P..., vingt ans, lingère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie gauche à dix-sept ans.

Réglée à treize ans.

Dernières règles : du 30 avril au 7 mai.

A l'auscultation rien de suspect. Dépression du thorax à la base gauche (au niveau de l'ancienne pleurésie.)

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 3.480 grammes à sa naissance et 3.650 gr. à la sortie le dixième jour.

Placenta 510 grammes. Membranes 27/8.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XVII (Obs. 302, 22 février 1902).

Femme G. E..., 26 ans blanchisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte cardiaque.

Père mort tuberculeux.

Réglée à dix-huit ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1901, en novembre, soignée à l'Hôtel-Dieu (1 ponction).

Dernières règles : du 14 au 20 mai. Etat général de la femme satisfaisant.

Aux poumons : sommet droit suspect. La femme présente de la cypho-scoliose.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 3.180 grammes à sa sortie le dixième jour.

Placenta 480 grammes. Membranes 28/8.

Suites de couches : le quatrième jour la température monte à 38 degrés et le pouls à 112. Injection intra-utérine et le lendemain la température est à 37°5 ; le sixième jour elle est normale.

Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XVIII (Obs. 4163, 18 juillet 1902).

Femme L. M..., trente ans, fruitière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à treize ans.

Réglée à quinze ans.

Dernières règles du 28 octobre. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 3.000 grammes à sa naissance (parti en nourrice).

Placenta 140 grammes. Membranes 26/4.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour satisfaisant.

OBSERVATION XIX (Obs. 1245, 1^{er} août 1902).

Femme C. B..., vingt deux ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort phtisique.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1897.

Réglée à seize ans.

Dernières règles : du 23 au 26 octobre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 2.950 grammes à sa naissance (parti en nourrice).

Placenta 480 grammes. Membranes 28/4.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION XX (Obs. 1418, 21 septembre 1902).

Femme D. M..., vingt-neuf ans, boursière, I-père.

Antécédents héréditaires. — Père mort à trente-cinq ans de tuberculose pulmonaire.

Réglée à seize ans.

Antécédents personnels. — Pneumonie et pleurésie à onze ans.

Anémie à quatorze ans.

Dernières règles : du 18 au 21 décembre.

Etat général de la femme satisfaisant.

Aux poumons : quelques frottements pleuraux à la base gauche.

Léger œdème aux membres inférieurs.

Nuage d'albumine au moment de l'accouchement. Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 2.730 grammes à sa naissance et 2.550 gr. à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 400 grammes. Membranes : mensuration impossible.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION XXI (Obs. 1750, 17 novembre 1902).

Femme B. J..., trente-cinq ans, modiste, I-père.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance, pleurésie à neuf ans, variole à dix-sept ans.

Dernières règles : du mois de janvier.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.320 grammes à sa naissance (parti en nourrice).

Placenta 450 grammes. Membranes 25/8.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION XXII (Obs. 189, 1^{er} février 1903).

Femme T. M..., domestique, dix-huit ans, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte d'embolie cardiaque.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quinze ans.

Pendant la grossesse, hypersécrétion vaginale abondante.

Dernières règles : 10 au 13 juin.

Etat général de la femme, bon.

A l'auscultation : inspiration rude au sommet gauche.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 1.720 grammes à sa naissance et 1.600 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta Châteaubriand : 320 grammes.

Membranes déchirées.

Suites de couches. — Premier jour, la température de 38°1.

Troisième et quatrième jour, de 37°5.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION XXIII (Obs. 236, 8 février 1903).

Femme N. J..., I-pare, femme de ménage, vingt-neuf ans.

Antécédents héréditaires. — Nuls.

Réglée à dix-sept ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-sept ans.

Dernières règles du 3 au 10 mai.

Rien au poudrons.

Application de forceps pour modification des bruits du cœur foetal.

Enfant pesant 3.440 grammes à sa naissance et 3.210 gr. à sa sortie le dixième jour.

Placenta : 470 grammes.

Membranes 29/12.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie, bon.

OBSERVATION XXIV (Obs. 238, 8 février 1903).

B. M..., I-pare, couturière, vingt-deux ans.

Antécédents héréditaires. — Père mort d'affection pulmonaire.

Antécédents personnels. — Réglée à onze ans, régulièrement.

Pleurésie à douze ans.

Dernières règles : 22 au 28 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 2.770 grammes à sa naissance et 2.470 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta : 29/13.

Suites de couches normales.

Etat satisfaisant de la mère à sa sortie.

OBSERVATION XXV (28 mars 1903, obs. 497).

Femme D. M..., vingt-trois ans, estampeuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à douze ans régulièrement, règles douloureuses.

Antécédents personnels. — A vingt ans pleurésie, depuis cette époque la femme tousse tous les hivers. Pertes blanches depuis trois ans.

Dernières règles du 27 septembre au 1^{er} octobre.

Etat général assez satisfaisant, à l'auscultation des poumons on trouve : respiration rude aux deux sommets. Le 14 mars la femme a commencé à perdre du sang (rapport sexuel). Le 28 mars elle expulse un fœtus macéré pesant 80 grammes. On fait l'extraction digitale d'un placenta de 120 grammes (Chateaubriand).

Suites de couches presque normales. Une seule fois le sixième jour la température montait à 38°f. Le huitième jour, elle est à 37°9, et le neuvième, normale. A la sortie de la femme, le quatorzième jour, son état général est bon.

OBSERVATION XXVI (11 avril 1903, obs. 623).

Femme B..., fleuriste, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quinze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine à quinze ans. Pleurésie à seize ans.

Dernières règles du 4 au 9 juin (?).

Rien aux poumons.

Accouchement spontané (présentation du siège). Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le huitième jour. Placenta 590 grammes.

Suites de couches : Température normale les trois premiers jours. Montée brusque de température le quatrième jour à 38°4, due à une lymphangite du sein droit. Le sixième jour la température redevient normale et la femme sort le huitième jour en bon état général.

OBSERVATION XXVII (26 mai 1903, obs. 893).

Femme R. E. . . , vingt-deux ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans.

Dernières règles du 3 au 6 août.

Etat général de la femme satisfaisant, sauf léger œdème des membres inférieurs. Rien aux poumons. Accouchement normal. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance et 3.470 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta Chateaubriand 590 gr. Membranes 32/12.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION XXVIII (4 juillet 1903, obs. 1116).

Femme C. J. . . , vingt-trois ans, fourreuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite et pleurésie à onze ans.

Dernières règles du 11 au 15 septembre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 4.020 grammes à sa naissance et 3.720 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta de 710 grammes. Membranes 29/2.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le septième jour, bon.

OBSERVATION XXIX (29 juillet 1903, obs. 1269).

Femme S. M..., vingt-quatre ans, infirmière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à vingt ans. Pleurésie à vingt-deux ans en 1901 soignée à Laënnec ; une ponction, liquide séro-fibrineux. Tousse un peu depuis. Un peu d'amaigrissement.

Dernières règles du 22 au 27 octobre.

Etat général assez satisfaisant. Rien aux poumons. Des varices très marquées aux membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.320 grammes à sa naissance et 3.400 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 595 grammes. Membranes 31/5.

Suites de couches normales. Etat général de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION XXX (13 juillet 1903, obs. 1275).

Femme B. E..., vingt-huit ans, femme de ménage, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite. Pleurésie à dix-huit ans en 1893.

Dernières règles du 28 octobre au 4 novembre.

Vomissements dans les cinq premiers mois de sa grossesse. Au moment de l'accouchement état général bon, rien aux poumons. Accouchement spontané. Enfant pesant 2.440 grammes à sa naissance et 2.500 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 360 grammes. Membranes 30/1.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION XXXI (2 août 1903, obs. 1291).

Femme A. L..., vingt et un ans, mécanicienne, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans et demi irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans, toussé depuis.

Dernières règles du 2 au 3 novembre.

Etat général de la femme assez satisfaisant. Aux poumons, les deux sommets suspects.

Une assez forte quantité d'albumine dans ses urines au moment de l'accouchement.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.300 grammes à sa naissance et 2.830 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta 650 grammes. Membranes 29/4.

Suites de couches, albumine pendant les trois premiers jours. Température le premier jour monte à 40,2 et le pouls à 128. La température et le pouls décroissent les jours suivants et le quatrième jour deviennent normaux. Etat de la femme à sa sortie le treizième jour, bon.

OBSERVATION XXXII (septembre 1903, obs. 1527).

M. C..., I-pare, domestique, dix-huit ans.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Antécédents personnels. — Réglée à quatorze ans, irrégulièrement. Pleurésie à dix-sept ans.

Dernières règles du 12 au 16 décembre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané (présentation du siège décomplété mode des fesses). Enfant pesant 2.750 grammes à sa naissance et 2.770 grammes à sa sortie le dixième jour. Membranes 33/2.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XXXIII (13 septembre 1903, obs. 1539).

P. A..., I-pare, vingt-trois ans, domestique.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Antécédents personnels. — Réglée à quinze ans, régulièrement. Pleurésie à dix-sept ans.

Dernières règles du 8 au 11 décembre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.910 grammes à sa naissance et 2.910 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 530 grammes.

Suites de couches normales. La mère quitte le service en bon état le huitième jour.

OBSERVATION XXXIV (26 octobre 1903, obs. 1800).

Femme I. J..., trente-cinq ans, ménagère, I pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte de congestion pulmonaire à trente ans.

Réglée à quatorze ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trente-trois ans en 1901.

Dernières règles du 18 au 20 janvier.

Rien aux poumons.

Pendant la grossesse un peu d'albumine dans les urines, régime lacté et au moment de l'accouchement plus d'albumine.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.350 grammes à sa naissance et 3.090 grammes à sa sortie le quatorzième jour. Placenta 625 grammes, membranes 32/5.

Suites de couches, température normale les huit premiers jours ; le neuvième jour elle monte à 38°7, le dixième jour à 39 degrés, le onzième elle redevient normale et le reste jusqu'à la sortie de la femme le quatorzième jour.

OBSERVATION XXXV (3 novembre 1903, obs. 1840).

Femme C. M..., quarante ans, femme de ménage, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à cinquante-sept ans d'affection pulmonaire.

Réglée à quinze ans, irrégulièrement, abondamment.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

Dernières règles du 25 au 28 janvier.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.680 grammes à sa naissance et 3.080 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 31/4.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XXXVI (3 novembre 1903, obs. 1842).

Femme G. J..., vingt-cinq ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Il y a trois mois pleurésie sèche du poumon gauche. Alitée pendant un mois à la Pitié.

Dernières règles du 19 au 23 février.

Etat général satisfaisant, aux poumons signes d'ancienne pleurésie sèche à gauche.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.760 grammes à sa naissance et 2.550 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 410 grammes, membranes 28/8.

Suites de couches normales. Etat de la mère à la sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XXXVII (30 décembre 1903, obs. 2150).

Femme A. D..., vingt-sept ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-cinq ans.

Dernières règles du 4 au 6 avril.

Petites hémorragies pendant la grossesse. Un peu d'albumine dans les urines. Rien aux poumons. Léger œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le onzième jour. Placenta 635 grammes. Membranes 26/4.

Suites de couches : la température normale sauf deux élévations à 39°7 et 39°4 avec un pouls à 96 et 97 les neuvième et dixième jours. Sortie de la femme le treizième jour en bon état.

OBSERVATION XXXVIII (18 mars 1904, obs. 433).

Femme J. I..., vingt-trois ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans, en 1901.

Dernières règles du 15 au 20 juin.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.050 grammes à sa naissance et 3.130 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 30/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION XXXIX (29 mars 1903, obs. 489).

Femme L. L..., vingt-deux ans, femme de chambre, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite et pleurésie en bas âge. Scarlatine à vingt et un ans.

La femme tousse toujours un peu.

Dernières règles du 19 au 22 mai.

Etat général assez bon. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. On trouvait un peu d'albumine dans ses urines. Elle entre à la clinique le 14 février. On la met au régime lacté absolu et au moment de l'accouchement on retrouve encore des traces d'albumine.

L'accouchement est spontané. Enfant pesant 3.420 grammes à sa naissance et 3.070 grammes à sa sortie le douzième jour. Placenta de 470 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches presque normales. Les sixième et septième jours seulement la température monte à 37°8. A la sortie de la femme le douzième jour la température est normale et son état général satisfaisant.

OBSERVATION XL (8 juin 1904, obs. 704),

Femme H. J..., dix-neuf ans, domestique, I-pare

Antécédents héréditaires. — Père mort tuberculeux à quarante ans. Mère morte tuberculeuse à trente-quatre ans. Sept frères et sœurs dont une est tuberculeuse.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Tousse souvent l'hiver.

Dernières règles du 17 au 20 août.

De l'albumine dans ses urines pendant la grossesse. Au moment de l'accouchement des traces d'albumine dans ses urines.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.930 grammes à sa naissance et 3.430 grammes à sa sortie le douzième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 25/8.

Suites de couches : température normale les sept premiers jours. Le huitième elle monte à 39 degrés et le pouls à 104. Le dixième jour la température et le pouls deviennent normaux. Etat de la femme à sa sortie le douzième jour, bon.

OBSERVATION XLI (17 juin 1904, obs. 754).

Femme L. J..., vingt et un ans, remailleuse, I-pare.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels — Rougeole à neuf ans. Pleurésie à onze ans. Erysipèle de la face à quatorze ans. Albumine consécutive. Régime lacté absolu.

Dernières règles du 12 au 14 septembre.

On a constaté de l'albumine pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Etat général de la mère assez bon, un peu d'œdème des membres inférieurs. Rien de particulier du côté des poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.200 grammes à sa naissance et 2.930 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 480 grammes. Membranes 37/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le septième jour, bon.

OBSERVATION XLII (10 juillet 1904, obs. 866).

Femme V. M..., vingt-cinq ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-neuf ans.

Dernières règles du 21 au 24 septembre

Pendant la grossesse au quatrième mois une bartholinite.
Etat général bon, rien à l'auscultation des poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.000 grammes à sa naissance et 2.820 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta de 500 grammes. Membranes 36/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le septième jour, satisfaisant.

. OBSERVATION XLIII (30 octobre 1904, obs. 1362).

Femme P. M..., vingt-cinq ans, journalière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1903 ayant nécessité une ponction.

Dernières règles du 30 décembre au 6 janvier.

Pendant les quatre premiers mois la femme avait des vomissements.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.700 grammes à sa naissance et 3.680 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta de 660 grammes. Membranes 28/5.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le huitième jour, bon.

OBSERVATION XLIV (26 octobre 1904, obs. 1485).

Femme L. H..., vingt-cinq ans, repasseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à vingt-quatre ans de tuberculose pulmonaire.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine à sept ans, fièvre typhoïde à vingt-deux ans, pleurésie sèche à vingt-quatre ans.

Dernières règles du 27 janvier au 2 février.

Au début de la grossesse des vomissements et de l'œdème des membres inférieurs. Au moment de l'accouchement on trouve des traces d'albumine dans les urines. Etat général assez bon, il persiste un peu d'œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.430 grammes à sa naissance et 3.550 grammes, à sa sortie le dixième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 25/8.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XLV (24 décembre 1904, obs. 1808).

Femme M. P..., vingt-sept ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à huit ans.

Dernières règles du 29 mars au 2 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement au neuvième mois (application de forceps). Enfant pesant 2.550 grammes à sa naissance et 2.680 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 300 grammes. Membranes 25/12.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XLVI (10 janvier 1905, obs. 43).

C. M..., vingt-quatre ans, confectionneuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de congestion pulmonaire.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance.

Pleurésie à six ans.

Dernières règles du 24 au 28 avril.

La femme entre dans le service le 4 janvier. Jusqu'à la veille de son accouchement le 9 janvier sa température oscille entre 39 et 38 degrés, le pouls entre 108 et 100. Cette élévation de température est due à une grippe.

A l'auscultation des poumons, rien de suspect.

Accouchement normal le 10 janvier. Enfant pesant 3.020 gr. à sa naissance et 2.750 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 29/5.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION XLVII (4 février 1905, obs. 172)

Femme L. J..., vingt-quatre ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement

Antécédents personnels. — Pleurésie à quinze ans.

Dernières règles du 3 au 8 mai.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.230 grammes à sa naissance et 2.170 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 410 grammes. Membranes 25/6.

Suites de couches: le cinquième jour la température monte à 38°4 ; pouls à 84 ; le sixième jour la température est à 37°5 et le septième à la normale. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XLVIII (27 février 1905, obs. 308).

Femme L. B..., de trente-deux ans, femme de ménage, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite à vingt-deux ans. Pleurésie à vingt-neuf ans.

Dernières règles du 10 au 13 mai.

Pendant la grossesse, traces d'albumine dans les urines. Pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Rien aux poumons.

Applications du forceps. Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 3.150 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 470 grammes. Membranes 31/0.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XLIX (27 avril 1905, obs. 643).

Femme D. M..., vingt-quatre ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-trois ans.

Dernières règles du 2 au 5 septembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.480 grammes à sa naissance et 2.210 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 660 grammes. Membranes 35/5.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION L (1^{er} mai 1905, obs. 664).

Femme J. D..., dix-neuf ans, tisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à onze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à onze ans.

Dernières règles du 17 au 19 juillet.

Pendant la grossesse, vaginite granuleuse intense, pertes verdâtres. Etat général assez satisfaisant. Au moment de l'accouchement on trouve 2 grammes d'albumine dans ses urines et de l'œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.520 grammes à sa naissance et 2.660 grammes à sa sortie le douzième jour. Placenta de 540 grammes, infarctus à la périphérie du placenta. Membranes 30/5.

Suites de couches : toujours de l'albumine dans les urines. L'albumine disparaît petit à petit et le douzième jour à sa sortie la femme ne présente plus que des traces. Température s'élève le dixième jour à 38°1. Pouls à 104, mais redevient normaux le jour suivant.

OBSERVATION LI (30 mai 1905, obs. 816).

Femme D. J..., cinquante et un ans, cuisinière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

Dernières règles du 15 au 18 août.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 2.670 grammes à sa sortie le quatrième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 32/6.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LII (4 août 1905, obs. 1182).

Femme N. R..., seize ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole, scarlatine à cinq ans. Pleurésie à sept ans.

Dernières règles du 28 octobre au 3 novembre.

Pertes blanches pendant la grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané, enfant pesant 3.050 grammes à sa naissance et 2.890 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta de 600 grammes. Membranes 32/3.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LIII (23 septembre 1905, obs. 1442).

Femme P. H..., vingt-trois ans, blanchisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-deux ans.

Dernières règles du 14 au 18 janvier.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.400 grammes à sa naissance, et 2.300 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 430 grammes. Membranes 37/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LIV (4 octobre 1905, obs. 1485).

Femme A. J..., vingt-deux ans blanchisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels — Pleurésie à six ans.

Dernières règles du 23 au 27 décembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.830 grammes à sa naissance et 2.720 grammes à sa sortie. Placenta 500 grammes. Membranes 30/1.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION LV (15 octobre 1905, obs. 1530).

Femme H..., vingt ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

Réglée à treize ans et demi régulièrement.

Dernières règles du 15 au 20 décembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance et 3.420 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 580 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION LVI (19 octobre 1905, obs. 1546).

Femme G. L., vingt-six ans, cuisinière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-deux ans, traitée par des pointes de feu et des vésicatoires.

Dernière règles du 12 au 16 janvier.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.750 grammes à sa naissance et 2.650 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 430 grammes. Membranes 30/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie, le neuvième jour bon.

OBSERVATION LVII (31 octobre 1905, obs. 1607).

Femme C. M..., vingt ans, modiste, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole, scarlatine dans l'enfance. Pleurésie à quatorze ans.

Dernières règles du 2 au 7 mars. La femme ne s'est pas reposée pendant toute sa grossesse. Dernier rapport sexuel remonte à deux jours. Etat général bon, sauf léger œdème des membres inférieurs.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.770 grammes à sa naissance et 2.660 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 350 grammes. Membranes 32/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION LVIII (20 décembre 1906, obs. 1908).

Femme F. F..., dix-huit ans, blanchisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en juillet 1904.

Dernières règles du 15 au 19 février.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.500 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 470 grammes. Membranes 32/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LIX (7 avril 1906, obs. 624).

Femme C. R..., brocheuse, vingt-cinq ans, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quinze ans.

Dernières règles du 19 au 25 août.

Pertes blanches pendant la grossesse. Etat général de la femme bon, rien d'anormal à l'auscultation des poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 1.750 grammes à sa naissance et 1.590 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 350 grammes. Membranes 21/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION LX (9 avril 1906, obs. 634).

Femme S. H..., trente-deux ans, repasseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à quarante-deux ans de tuberculose pulmonaire.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en février 1906.

Dernières règles du 14 au 22 juillet.

Dernier rapport sexuel remonte à trois jours.

Accouchement spontané au neuvième mois (présentation du siège). Enfant pesant 2.700 grammes à sa naissance et 2.250 gr. à sa sortie le neuvième jour. Placenta 560 grammes. Membranes 29/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION LXI (8 mai 1906, obs. 815).

Femme G. K..., dix-neuf ans, repasseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine à huit ans. Rhumatisme articulaire aigu à dix ans. Pleurésie à dix-huit ans.

Dernières règles du 18 au 22 septembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au huitième mois. Enfant pesant 1.880 grammes à sa naissance, mort dans la nuit même, Placenta 460 grammes. Membranes 28/2.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXII (10 juillet 1906, obs. 1167).

Femme S. J..., trente-trois ans, domestique, 1-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à seize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à cinq ans.

Dernières règles du 12 octobre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 3.220 grammes à sa naissance et 2950 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 440 grammes. Membranes 37/5.

Suites de couches : Une seule élévation de température à 38°2 et pouls à 96 le sixième jour. Le jour suivant la température et le pouls redeviennent normaux et restent tels jusqu'à la sortie de la femme le neuvième jour. Etat de la femme à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION LXIII (8 août 1906, obs. 1336).

Femme D. A..., vingt et un ans, demoiselle de magasin, 1-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à onze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchites dans l'enfance pleurésie en février 1905.

Dernières règles du 28 octobre au 1^{er} novembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.730 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 420 grammes. Membranes 28/6.

Suites de couches normales jusqu'au dixième jour. Température monte à 39°2 le dixième jour, les onzième et douzième jours elle est à 39°4. Cette élévation de température est due à une lymphangite du sein droit. La femme sort le treizième jour dans un état satisfaisant.

OBSERVATION LXIV (11 septembre 1906, obs. 1521).

Femme M. C..., quarante ans, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-neuf ans. Bronchites fréquentes.

Dernières règles du 6 au 10 décembre.

Rien aux poumons. Un petit fibrome sur la face antérieure de l'utérus.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.500 grammes à sa naissance et 3.350 grammes à sa sortie le dixième jour. Délivrance artificielle pour hémorragie. Placenta 410 grammes, Membranes 39/13.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXV (27 septembre 1906, obs. 1613).

Femme D. E..., dix-sept ans, plumassière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine, pleurésie à sept ans. Rougeole à neuf ans.

Dernières règles du 2 au 7 février.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au huitième mois. Enfant pesant 2.050 grammes à sa naissance et 1.880 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 40/7.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION LXVI (29 octobre 1906, obs. 1789).

Femme G. F..., dix-huit ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quatorze ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à cinq ans. Pleurésie à seize ans.

Dernières règles du 27 au 31 décembre,

Dernier rapport sexuel date de la veille de l'accouchement.
Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.280 grammes à sa naissance et 3.220 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 30/6.

Suites de couches : Température s'élève les sixième et septième jours à 39 degrés, le pouls oscille entre 100 et 128. A partir du huitième jour la température et le pouls restent normaux jusqu'à la sortie de la femme le neuvième jour. Cette élévation de température était due à une lymphangite du sein droit. Etat de la femme à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION LXVII (10 novembre 1906, obs. 1864).

Femme W. M..., vingt-sept ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à douze ans.

Dernières règles du 22 au 25 février.

Pendant la grossesse plusieurs hémorragies.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 3.200 grammes à sa naissance et 2.940 grammes le seizième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 40/0.

Suites de couches : la température et le pouls, d'abord normaux, commencent à s'élever progressivement du troisième au sixième jour où ils atteignent leur maximum 40°2 et 140. Pendant ce temps on fait des injections intra-utérines qui ramènent des débris membraneux. Le sixième jour curettage par M. Mouchotte. La température et le pouls s'abaissent progressivement jusqu'au onzième jour, 37 degrés et 92, puis remontent en même temps qu'apparaît une éruption scarlatineiforme. La malade est renvoyée à l'Institut Pasteur, sa température est à ce moment de 39°2 et le pouls à 120. Le 27 décembre elle sort de l'Institut Pasteur complètement guérie.

OBSERVATION LXVIII (12 novembre 1906, obs. 1875).

L. J..., dix-sept ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

Dernières règles, du 7 au 12 avril.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Dernier rapport sexuel quelques heures avant le début du travail.

Rien aux poumons.

Accouchement au huitième mois. Enfant pesant 1.650 gr. à sa naissance, mort deux jours après. Placenta 300 grammes. Membranes 28/13.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION LXIX (22 décembre 1906, obs. 2108).

C. V..., vingt et un ans, blanchisseuse, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à quarante et un ans d'affection pulmonaire.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie et pneumonie à quatorze ans.

Dernières règles du 28 au 30 avril.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Légère hémorrhagie dix jours avant l'accouchement.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.100 grammes à sa naissance et 2.070 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 340 grammes. Membranes 31/13.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION LXX (27 mars 1907, obs. 500).

Femme S. A..., dix-huit ans, ménagère I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à seize ans,

Dernières règles du 8 au 12 juin,

Légère albuminurie pendant la grossesse. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 4.350 grammes à sa naissance et 4.100 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 585 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon,

OBSERVATION LXXI (9 juillet 1907, obs. 1072 bis).

V. G..., vingt-quatre ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Un frère mort, à trente ans, d'affection pulmonaire.

Réglée à treize ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-sept ans.

Dernières règles du 12 au 18 octobre.

Dernier rapport la veille de l'accouchement.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 2.900 grammes à sa sortie le quatorzième jour. La femme accouche chez elle. Elle est transportée à la clinique pour être délivrée. Sa température est de 37 degrés. Pouls à 130. M^{lle} Rose pratique la délivrance artificielle et extrait un placenta de 600 grammes.

Suites de couches. La température monte les quatrième et cinquième jours à 38°6 pour redevenir normale le sixième jour. Le pouls reste accéléré. A sa sortie le quatorzième jour la femme est dans un état satisfaisant.

OBSERVATION LXXII (6 août 1907, obs. 1235).

C. G..., vingt-six ans, couturière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à cinq ans. Pleurésie à dix ans.

Dernières règles du 20 au 22 octobre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.200 grammes à sa

naissance et 3.250 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 420 grammes. Membranes 25/3.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION LXXIII (13 novembre 1907, obs. 1771).

P. C..., vingt-cinq ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans.

Dernières règles du 2 au 4 février.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.150 grammes à sa naissance et 3.030 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 31/9.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION LXXIV (20 janvier 1908, obs. 125).

S. J..., vingt-sept ans, employée de commerce, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à dix-huit ans.

Pleurésie à huit ans.

Dernières règles du 27 avril au 3 mai.

Dernier rapport la veille de l'accouchement.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.320 grammes à sa naissance et 2.480 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 380 grammes. Membranes 24/12.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXV (6 février 1908, obs. 241).

L... E..., vingt-six ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à vingt ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-huit ans en 1907.

Dernières règles du (?).

Vomissements pendant toute la durée de la grossesse. Céphalée. Douleurs épigastriques. Albumine dans les urines pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Etat général assez satisfaisant. A l'auscultation des poumons, bronchite légère. Diminution du murmure vésiculaire à la base droite. Léger œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 2.750 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta 400 grammes. Foyers hémorragiques ancien et récents. Membranes 27/12.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION LXXVI (3 avril 1908, obs. 579).

P. V..., vingt-huit ans, concierge, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite à quinze ans. Pneumonie à seize ans. Pleurésie à dix-huit ans en 1901. Scarlatine à vingt-cinq ans.

Dernières règles du 10 au 14 juillet.

Pendant la grossesse la femme avait de l'albumine dans ses urines. Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.450 grammes à sa naissance et 2.700 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 400 grammes. Foyers hémorragiques. Membranes 20/7.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION LXXVII (8 mai 1908, obs. 794).

R... A..., vingt-quatre ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de pleurésie.

Réglée à treize ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie ayant duré deux mois en 1901.

Dernières règles du 16 au 18 novembre.

Rien aux poumons.

Expulsion spontanée d'un fœtus pesant 820 grammes. Placenta 200 grammes. Rétention presque totale des membranes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXVIII (17 décembre 1908, obs. 2139).

P. M..., dix-sept ans, journalière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à cinquante ans de tuberculose pulmonaire. Une sœur morte à dix-huit ans aussi de tuberculose pulmonaire.

Réglée à treize ans régulièrement.

Dernières règles du 24 au 28 mars.

Bassin légèrement rétréci. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.700 grammes à sa naissance et 2.600 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 24/10.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION LXXIX (6 avril 1909, obs. 572).

A. L..., vingt-six ans, domestique, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie droite à dix-huit ans.

Dernières règles du 15 au 20 juillet. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.100 grammes à sa naissance et 3.140 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 28/0.

Suites de couches : température normale les trois premiers jours, le quatrième jour elle s'élève brusquement à 38°5 et le pouls à 120. Le sixième jour la température et le pouls redeviennent normaux et restent tels jusqu'à la sortie de la femme le dixième jour. Son état général à sa sortie est bon.

OBSERVATION LXXX (27 avril 1909, obs. 699).

M. B..., vingt et un ans, passementière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à quarante-neuf ans d'affection pulmonaire.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans.

Dernières règles du 10 au 14 juillet.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.700 grammes à sa naissance et 3.570 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 31/9.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

Multipares

OBSERVATION LXXXI (24 janvier 1909, obs. 147).

Femme C. F..., vingt-cinq ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole, scarlatine à dix ans. Fièvre typhoïde à vingt ans, pleurésie à treize ans.

Réglée à treize ans.

Premier accouchement normal en 1897. Enfant élevé au biberon par une nourrice, vivant. La mère se place comme nourrice pour un autre enfant, qu'elle nourrit pendant dix-huit mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 13 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.900 grammes à sa naissance et 3.030 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 480 grammes. Membranes 28/12.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXXII (10 février 1900, obs. 207).

Femme B. L..., trente-cinq ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-trois ans, en 1888.

Réglée à douze ans régulièrement.

1° Avortement dans le cours du troisième mois en 1886 de cause inconnue ;

2° Accouchement normal en août 1887. Enfant nourri au verre par la mère, bien portant ;

3° Accouchement au neuvième mois en novembre 1893 (Baudelocque, obs. 1597). Enfant pesant 2.790 grammes à sa naissance et 2.680 grammes à sa sortie au dixième jour. Placenta 380 grammes. Suites de couches normales. Enfant nourri au sein maternel pendant vingt-deux mois, bien portant ;

4° Accouchement normal en juin 1895 (Baudelocque, obs. 1066). Enfant pesant 3.550 grammes à sa naissance et 3.750 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta : 630 grammes. Suites de couches parfaites. Enfant nourri au sein maternel un mois, au biberon ensuite, mort à onze mois de variole ;

5° Accouchement normal (Baudelocque, obs. 1648) le 23 septembre 1896. Enfant pesant 3.180 grammes à sa naissance et 3.100 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta : 450 grammes. Suites de couches normales. Enfant nourri au sein maternel pendant vingt-sept mois, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 24 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 3.350 grammes à sa naissance et 3.170 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta : 500 grammes. Membranes 27/7(?).

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXXIII (27 mars 1903, obs. 563).

Femme M. P..., quarante-cinq ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie gauche à quatorze ans. Tousse depuis l'âge de trente ans. Amaigrissement, crachement de sang pendant sept ans.

Réglée à treize ans.

Deux accouchements normaux en 1886 et 1887.

Des deux enfants nourris au sein maternel ; le premier mort à sept ans et demi (cause inconnue), le deuxième bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 2 au 6 mai.

Etat général . Aux poumons : des râles humides et gargouillements au sommet gauche ; des craquements au sommet droit.

La femme crache du sang de temps en temps.

Température de 37 degrés. Pouls à 80.

Accouchement normal ; enfant pesant 2.900 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le dixième jour. Placenta 490 grammes. Membranes 25/6.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le onzième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXXIV (1^{er} mai 1900, obs. 804).

Femme V. M..., trente-neuf ans, blanchisseuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1897 à trente-six ans.

Réglée à dix-sept ans.

Premier accouchement normal en 1889. Enfant nourri au sein maternel pendant dix-huit mois, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 9 au 12 août.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 3.150 grammes à sa naissance et 3.110 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 670 grammes. Membranes 24/2. Suites de couches normales. Température maximum 37°6 le huitième jour.

Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, satisfaisant..

OBSERVATION LXXXV (19 mai 1900, obs. 918).

Femme L. L..., trente-cinq ans, employée, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Rougeole à dix ans.

Pleurésie droite en 1890 à vingt-cinq ans.

Réglée à dix-sept ans régulièrement.

Trois accouchements normaux en 1893, 1897 et 1899.

Premier accouchement prématuré au huitième mois en 1894, l'enfant meurt douze jours après sa naissance.

Des trois autres nés à terme et nourris tous au sein par une nourrice, deux sont vivants, le troisième est mort à deux ans de broncho-pneumonie.

Grossesse actuelle : Dernières règles 19 au 20 novembre.

Depuis le mois de mars la femme dit perdre du sang par intermittences.

Elle entre à la clinique le 22 avril. A son entrée son état général était assez satisfaisant.

Rien aux poumons à noter. Hypertrophie cardiaque avec dédoublement du deuxième bruit. Elle continue pendant son séjour à l'hôpital ; a perdu du sang liquide, et des caillots par petites quantités. Malgré le repos continu et les injections chaudes, le 17 mai elle perd une quantité de sang plus considérable, sa température est de 36°8, son pouls à 92. On lui donne des injections chaudes, et elle expulse un fœtus vivant de 660 grammes, puis un placenta pesant 240 grammes, les membranes sont déchirées, et la mensuration impossible.

Suites de couches :

La température et le pouls s'élèvent progressivement pendant les premiers jours pour atteindre leur maximum 39°6 et 116. Des injections utéro-utérines faites pendant ce temps ramènent des débris le quatrième jour. M. Paquy pratique un curetage qui ramène de nombreux débris, la température de la femme oscille encore jusqu'au huitième jour entre 38 et 39 degrés, le pouls entre 100 et 128. A partir du neuvième jour tout rentre dans l'ordre et l'état général de la femme est très satisfaisant à sa sortie le dix-huitième jour.

OBSERVATION LXXXVI (22 juin 1900, obs. 1151).

Femme A. M..., vingt-cinq ans, vendeuse au panier, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Libin

4

Antécédents personnels. — Pleurésie et bronchite à deux ans.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Premier accouchement normal en 1896.

Enfant nourri au sein maternel pendant un mois, puis par une nourrice, mort à deux mois (cause inconnue).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 14 au 18 octobre.

Pendant la grossesse on constate de l'albuminurie dans les urines, Régime lacté pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Pas d'albuminurie au moment de l'accouchement.

Etat général de la femme, bon.

Accouchement spontané au huitième mois. Enfant pesant 2.280 grammes à sa naissance et 2540 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 370 grammes. Membranes 38/10.

Suites de couches parfaites.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION LXXXVII (27 juin 1900, obs. 1182).

Femme T. L..., dix-neuf, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie gauche en 1892.

Réglée à treize ans régulièrement.

Premier accouchement normal en 1896. Enfant nourri au sein maternel pendant quinze jours, au biberon ensuite, bien portant.

Deuxième accouchement à terme, spontané (présentation du siège). Enfant nourri au sein maternel pendant onze mois, mort à un an (cause inconnue).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 25 juillet.

Rien aux poumons.

Accouchement normal : Enfant pesant 3.560 grammes à sa naissance et 3.750 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 590 grammes. Membranes 26/12.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION LXXXVIII (obs. 1245, 4 juillet 1900).

Femme C. J..., vingt-sept ans, culottière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole et varioloïde dans l'enfance. Leucorrhée abondante depuis deux ans. *Pleurésie* en 1897, à vingt-quatre ans.

Premier accouchement normal en 1892. Enfant nourri au sein maternel pendant dix-huit mois, mort à vingt-deux mois (cause inconnue).

Grossesse actuelle: Dernières règles du 11 au 15 septembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.180 grammes à sa naissance et 3.280 grammes à sa sortie le quatrième jour (parti en nourrice).

Placenta 420 grammes. Membranes 36/10.

Suites de couches parfaites.

Etat de la mère à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION LXXXIX (obs. 1497, 10 août 1900).

Femme J. L..., vingt-trois ans, relieuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort asthmatique.

Antécédents personnels. — Scarlatine à huit ans. *Pleurésie* à dix-huit ans.

Réglée à quinze ans.

Premier accouchement au huitième mois (Baudelocque, obs. 875). Enfant pesant 2.050 grammes à sa naissance et 2.060 grammes à sa sortie le dixième jour.

Placenta 410 grammes.

Suites de couches normales.

Enfant nourri par une nourrice, mort à cinq mois (?).

Grossesse actuelle: Dernières règles du 18 au 20 novembre.

Etat général de la femme: au cœur le premier bruit est dur et claqué.

Aux poumons: respiration rude; de légers craquements en arrière et à droite.

Température de 37 degrés. Pouls à 76.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant

2.520 grammes à sa naissance et 2.650 grammes à sa sortie le dixième jour.

Placenta 425 grammes. Membranes 24/5.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION XC (Obs. 1836, 28 septembre 1900).

Femme F. L..., dix-neuf ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à cinq ans.

Réglée à onze ans et demi régulièrement.

Premier accouchement normal en 1899.

Enfant nourri au sein maternel pendant neuf mois, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 27 janvier.

Dernier rapport sexuel la veille de l'accouchement.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.030 grammes à sa naissance et 1.960 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 390 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCI (Obs. 1841, 28 septembre 1900).

Femme M. C..., vingt-six ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de tuberculose pulmonaire.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine à quatorze ans.

Pleurésie à dix-sept ans et fièvre typhoïde à vingt-cinq ans.

Premier accouchement normal en 1895. Enfant nourri au sein maternel pendant six mois, au biberon ensuite, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 2 janvier.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant

3.340 grammes à sa naissance et 3.450 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 490 grammes. Membranes 32/11.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCII (obs. 1877, 4 octobre 1900).

Femme F. L..., vingt-neuf ans, cuisinière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de congestion pulmonaire.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans.

Réglée à treize ans régulièrement.

Premier accouchement normal en 1895 (Baudelocque, obs. 110.)

Suites de couches normales.

Enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance (placenta 600 gr.), mis au biberon chez une nourrice, mort à six mois. Entérite (juillet).

Suites de couches normales.

Deuxième accouchement normal en 1896 (Baudelocque, obs. 347.)

Enfant pesant 3.100 grammes à sa naissance (placenta 640 gr.), nourri au biberon par une nourrice, vivant et bien portant. Suites de couches normales.

Troisième accouchement normal en 1897.

Enfant nourri au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle: Dernières règles du 14 au 17 décembre. Rien aux poumons. Accouchement normal. Enfant pesant 3.870 grammes à sa naissance.

Placenta 700 grammes.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCIII (Obs. 1888, 6 octobre 1900).

Femme S. A..., trente-deux ans, couturière, VII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1894.

Réglée à douze ans et demi régulièrement, trois accouche-

ments normaux en 1893, 1898 et 1899 et trois avortements dans le troisième mois. Premier enfant nourri au sein maternel pendant huit mois, bien portant. Les deux autres enfants nourris au biberon, morts à deux mois d'entérite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 21 au 26 janvier.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 2.360 grammes à sa naissance et 2.370 gr. à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 470 grammes. Membranes 39/7.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCIV (obs. 1938, 24 octobre 1900).

Femme R. B..., vingt-sept ans, lingère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance. Pleurésie en 1898.

Réglée à douze ans régulièrement.

Premier accouchement normal en 1898. Enfant nourri au biberon, mort d'entérite à huit mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 15 janvier.

Etat général de la femme. Hémoptysies de temps en temps.

Sueurs nocturnes. Aux poumons : Sommet droit suspect.

Température, 39°9. Pouls 68.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 3.250 grammes à sa naissance et 3.500 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes : 29/12.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCV (obs. 2112, 8 novembre 1900).

Femme V. E. ..., trente-huit ans, cuisinière, XIV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort tuberculeux.

Antécédents personnels. — Pleurésie à onze ans.

La femme toussait toujours et a craché du sang à plusieurs reprises.

Douze accouchements normaux (1886-1899), un chaque année de 1886 à 1899.

Un avortement gémellaire dans le cours du deuxième mois en ? Les douze enfants tous nourris par des nourrices, huit sont vivants et bien portants. Les autres sont morts en bas âge d'affections diverses, un de tuberculose (?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 8 mars. Etat général de la femme satisfaisant.

Pendant la dernière grossesse la femme a eu deux hémorragies, dont la dernière a provoqué l'accouchement prématuré au neuvième mois. Enfant pesant 3.300 grammes à sa naissance et 3.150 grammes à sa sortie le cinquième jour (mis en nourrice). Délivrance artificielle. Placenta 710 grammes. Membranes 48/0.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le dix-huitième jour : bon.

OBSERVATION XCVI (obs. 2144, 12 novembre 1900).

Femme C. M..., quarante et un ans, cuisinière, IV-pare.

Antécédents héréditaires.— Rien à noter.

Antécédents personnels.— Pleurésie en 1885. Hémoptysie. Fluxion de poitrine en 1890 et pleurésie droite. Laryngite ayant nécessité la trachéotomie, depuis la femme tousse tous les hivers.

Nouvelle pleurésie en 1898, soignée à Lariboisière.

Réglée à dix-sept ans et demi irrégulièrement. Un avortement gémellaire en 1878 (accident de voiture).

Deuxième accouchement normal en 1879 : enfant mort à seize ans et demi de tuberculose pulmonaire.

Troisième accouchement à Baudelocque (obs. 859 de 1898). Pendant cette grossesse la femme avait sa dernière pleurésie et des hémoptysies, son état général au moment de l'accouchement était assez bon : température et pouls normaux, 37 degrés et 76.

A l'auscultation des poumons on trouvait : au sommet droit en avant de la submatité ; à la base droite en arrière de la matité et de la diminution du murmure vésiculaire. Au cœur souffle systolique à l'orifice pulmonaire. Accouchement normal,

enfant de 3.450 grammes à sa naissance et 4.550 grammes à sa sortie le vingt-troisième jour. Placenta 450 grammes. Suites de couches presque normales. Une seule élévation de température à 38 degrés (le troisième jour). La femme sort de la clinique le vingt-troisième jour dans un état assez satisfaisant. Enfant nourri au sein, mort à sept ans de méningite. Grossesse actuelle :

Dernières règles du 8 au 10 février. Etat général de la femme assez satisfaisant. Aux poumons : submatité sous la clavicule droite, respiration rude. Matité en arrière à la base droite et diminution du murmure vésiculaire, vibrations conservées. Œdème des membres inférieurs. Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 4.070 grammes à sa sortie le vingt-quatrième jour. Placenta. 520 grammes. Membranes : 29/14. Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le vingt-quatrième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCVII (obs. 2424, 28 décembre 1900).

Femme P. L..., vingt-quatre ans, femme de ménage, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Père asthmatique.

Antécédents personnels. — Pneumonie et pleurésie à dix-huit ans, en 1894.

Un accouchement à terme (application du forceps) en 1897. Enfant mort pendant l'extraction.

Deuxième accouchement normal en 1898. Enfant nourri au biberon, mort à six mois de (?) (juillet).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 25 au 28 mars.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 3.680 grammes à sa naissance et 3.720 gr. à sa sortie, le dixième jour.

Placenta 550 grammes. Membranes 31/4.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION XCVIII (obs. 88, 14 janvier 1901).

Femme M. A..., trente-six ans, ménagère, X-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte tuberculeuse.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance.

Fluxion de poitrine à neuf ans, pleurésie gauche à dix-sept ans, en 1883.

Un accouchement à terme (application de forceps) en 1882. Enfant mort trois jours après la naissance. Sept accouchements normaux (1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1895, 1898). Une seule fois cette femme est venue accoucher à Baudelocque en 1895. (Voir obs. ci-dessous). Les autres accouchements se sont passés chez elle, et tous ses enfants nourris au sein maternel, sauf un au biberon, sont vivants et bien portants. En 1895 elle accoucha à Baudelocque (obs. 938). Son état général était bon.

Enfant pesant 3.230 grammes à sa naissance et 3.430 gr. à sa sortie le treizième jour. Placenta 550 grammes. Suites de couches normales sauf une élévation de température dans les premiers jours causée par une lymphangite du sein gauche.

Etat de la femme à sa sortie le treizième jour, satisfaisant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 8 au 12 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal.

Enfant pesant 4.010 grammes à sa naissance et 4.000 gr. à sa sortie le huitième jour.

Placenta 600 grammes. Membranes : 28/4.

Suites de couches normales. Température maximum 37 degrés.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION XCIX (obs. 176, 27 janvier 1901).

Femme G. A..., vingt-cinq ans. Domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Rougeole à huit ans, scarlatine à dix ans.

Pleurésie en 1900.

Réglée à dix-neuf ans.

Un accouchements normal en 1898. Enfant mort à onze mois (?)

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 au 18 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.440 grammes à sa naissance et 3.520 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 570 grammes, Mémbranes : 30/6.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION C (23 février 1901, obs. 20).

Femme W. Z..., ménagère, trente-cinq ans, VII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Rougeole à six ans, pleurésie gauche en 1900 (deux ponctions); 5 accouchements antérieurs normaux.

4 enfants vivants. Un sixième accouchement au septième mois, enfant mort au bout de quinze jours.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 25 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.820 grammes à sa naissance et 3.760 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 600 grammes. Membranes 29/10.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CI (3 mars 1901, obs. 408).

Femme D. C..., trente et un ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1900.

Réglée à treize ans.

Un accouchement normal en 1895.

Enfant nourri au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 28 au 30 juin.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.890 grammes à sa naissance et 3.030 grammes à sa sortie le huitième jour.

Placenta 480 grammes. Membranes 27/10.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour bon.

OBSERVATION CII (12 mars 1901, obs. 462).

Femme S. E..., âgée de vingt-trois ans, modiste, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de fièvre jaune.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

Rhumatisme articulaire aigu qui a commencé à seize ans et a duré quatre ans.

Réglée à douze ans et demi.

Trois accouchements normaux (1895, 1896, 1899). Des 3 enfants nourris par la mère d'abord au sein, au biberon ensuite, 2 sont vivants et bien portants, le troisième est mort à deux mois d'entérite (en août).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 13 au 15 juin.

Pendant la grossesse on trouvait de l'albumine dans ses urines.

Régime lacté. Plus d'albumine au moment de l'accouchement.

Rien aux poumons, ni au cœur.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 3.180 grammes à sa naissance et 3.280 grammes à sa sortie le dixième-jour.

Placenta 460 grammes. Mensuration des membranes impossible.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour; bon.

OBSERVATION CIII (7 avril 1901, obs. 613).

Femme M. C..., vingt-six ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte d'une maladie de cœur.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-cinq ans au mois d'avril 1900.

Deux accouchements normaux en 1898 et 1900.

Les deux enfants nourris au biberon sont morts en bas âge (?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 12 au 15 juin.

Rien aux poumons ni au cœur.

Accouchement normal à terme. Enfant pesant 3.080 gr. à sa naissance et 2.970 grammes à sa sortie le dixième jour.

Placenta 400 grammes. Membranes 29/9.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CIV (obs. 632, 10 avril 1901).

Femme D. H..., quarante-trois ans, laveuse, VIII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie, pneumonie à dix-huit ans en 1876.

Réglée à dix-huit ans régulièrement.

Premier avortement dans le cours du cinquième mois en (?).

Six accouchements normaux en 1889, 1891, 1893, 1895, 1897 et 1899.

Des six enfants nourris au sein maternel deux sont vivants. Les autres sont morts en bas âge d'affections diverses.

Grossesse actuelle : Dernières règles de la fin de juin.

Rien aux poumons.

Accouchement normal à terme.

Enfant pesant 3.200 grammes à sa naissance et 3.070 gr. à sa sortie le septième jour.

Placenta 490 grammes. Membranes 28/4.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le septième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CV (obs. 665, 16 avril 1901).

Femme L. M..., vingt-trois, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt et un an en 1899.

Réglée à dix-huit ans.

Un accouchement normal en 1898 (enfant mort-né).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 8 octobre.

Rien aux poumons.

Expulsion six mois après les dernières règles d'un fœtus mort et macéré.

Placenta 160 grammes. Membranes 19/7.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION CVI (21 avril obs. 693).

Femme T. B. . . , âgée de trente-sept ans, VII-pare, journalière.

Antécédents héréditaires. — Père mort, d'une pneumonie.

Antécédents personnels. — Variole à seize ans. Pneumonie à dix-neuf ans suivie d'une pleurésie double.

Réglée à dix-huit ans, régulièrement.

I. — En 1890, accouchement spontané au huitième mois d'un enfant mort pendant le travail.

II. — En 1891, accouchement spontané au neuvième mois. Enfant nourri au sein maternel trois mois, puis au biberon par la mère mort à quatre mois.

III. — En 1895, accouchement à terme. Enfant nourri au biberon par la mère, mort à deux mois de (?). Le procréateur de ses enfants était éthylique.

IV. — En 1896, accouchement spontané au neuvième mois. (Baudelocque, obs. 1827). Etat général de la femme bon. Enfant pesant 2.700 grammes et 2.690 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 430 grammes. Pendant les suites de couches la température reste normale, sauf le dixième jour 38°8 (lymphangite des deux seins). Sortie le quatorzième jour en bon état. L'enfant meurt à dix-huit mois d'athrepsie aux Enfants-Malades.

V. — 1899 (Baudelocque, obs. 941). — Accouchement au neuvième mois. Application de forceps par M. Pinard qui constate chez cette femme un rétrécissement du détroit supérieur D. P. S. P. 10,3. Enfant vivant pesant 3.350 grammes à sa naissance et 3.630 à sa sortie le huitième jour. Placenta 430 gr. L'état général de la femme au moment de l'accouchement est bon. A l'auscultation des poumons quelques râles de bronchite. Suites de couches normales. Etat satisfaisant à la sortie, huitième jour. L'enfant est nourri au sein jusqu'à treize mois, puis au biberon, meurt à quatorze mois, à Trousseau, de scarlatine et entérite.

VI. — 17 mars 1901 (Baudelocque, obs. 693). — Dernières règles du 1^{er} au 2 juillet. Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.680 grammes à sa naissance et 2.740 à sa sortie, le septième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 30/8. Rien aux poumons. Suites de couches normales. Maximum 37°3. Sortie le septième jour en bon état.

OBSERVATION CVII (22 avril 1901, obs. 703).

Femme B..., trente-cinq ans, couturière, VIII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine dans l'enfance. Fièvre typhoïde à trois ans. Pleurésie à seize ans en 1882. Fluxion de poitrine à vingt-six ans.

Réglée à onze ans.

Premier avortement dans le cours du troisième mois en 1886. Cinq accouchements normaux en 1887, 1888, 1892, 1895, 1899.

Une septième grossesse se termine par un avortement au cours du deuxième mois en 1900. Des cinq enfants venus à terme et nourris au sein maternel un seul est vivant et bien portant. Les autres sont morts en bas âge, de bronchites ou de convulsions. Le premier est mort une heure après sa naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 22 au 29 juillet. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 3.090 grammes à sa naissance et 2.900 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 510 grammes. Membranes 25/5.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le septième jour bon.

OBSERVATION CVIII (26 avril 1901, obs. 732).

Femme N. E..., trente-quatre ans, mégissière, VI-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-sept ans en 1884. Réglée à treize ans.

Deux accouchements normaux en 1891 et 1896.

Premier enfant élevé à l'allaitement mixte, mort à neuf mois d'entérite.

Deuxième enfant mis en nourrice, mort à quinze jours (de ?)

Troisième et quatrième se terminent par des expulsions de fœtus macérés dans le cours du sixième mois (1897 et 1898).

Cinquième grossesse se termine par un accouchement normal en mai 1900.

Enfant mis en nourrice mort à deux mois et demi. Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 août. Rien aux poumons.

Expulsion d'un fœtus macéré pesant 2.300 grammes dans le cours du huitième mois. Placenta 570 grammes. Membranes 36/14.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CIX (6 mai 1901, obs. 781).

Femme L. M..., soixante et un ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père Mort de la rupture d'un anévrisme.

Antécédents personnels. — Pleurésie droite à vingt et un ans en 1892. Scarlatine en 1896.

Réglée à quatorze ans.

Premier accouchement normal en 1894 (Baudelocque, obs. 1240). Enfant pesant 3.070 grammes à sa naissance et 2.790 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 580 gr.

Suites de couches normales.

Deuxième accouchement normal (enfant macéré) en 1896.

Troisième accouchement au neuvième mois en 1897 (Baudelocque, obs. 1399). Enfant pesant 3.370 grammes à sa naissance et 3.750 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 465 gr.

Suites de couches normales. Température 37 degrés.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 7 au 10 août.

Dernier rapport date de quatre jours. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Accouchement spontané au neuvième mois de deux enfants : premier pesant 2.670 grammes à sa naissance et 2.790 grammes à sa sortie le neuvième jour. Deuxième pesant 2.130 grammes

à sa naissance et le même poids à sa sortie le neuvième jour.
Placenta 730 grammes. Membranes 37/9.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CX (obs. 924, 28 mai 1901).

Femme B. J..., quarante-cinq ans, marchande des quatre saisons, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte de pneumonie.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-neuf ans en 1875.

Congestion pulmonaire en 1893. Ulcère de l'estomac en 1890 (hématémèse et mélœna). En 1898 nouvelle hématémèse.

Réglée à onze ans et demi.

Premier accouchement normal en 1879. Enfant nourri au sein maternel, vivant.

Deuxième accouchement au huitième mois en 1881. Enfant nourri au sein maternel, mort à un an de rougeole.

Troisième et quatrième accouchements normaux en 1883 et 1887. De ces deux enfants un nourri au sein maternel est vivant, l'autre nourri au biberon est mort à dix mois d'entérite (août).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 6 au 9 septembre.

Etat général de la femme : Température 37 degrés, pouls 68 ; au cœur on trouve de l'insuffisance mitrale ; aux poumons, signes de bronchite.

De l'œdème des membres inférieurs.

Utérus fibromateux.

Accouchement normal au neuvième mois.

Enfant pesant 2.430 grammes à sa naissance et 2.800 gr. à sa sortie le dix-huitième jour.

Placenta 480 grammes. Membranes 32/0.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le dix-huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXI (obs. 1010, 12 juin 1901).

Femme P. A..., quarante ans, confectionneuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort bacillaire.

Mère morte d'une maladie du cœur.

Antécédents personnels. — Pleurésie droite à trente-deux ans en 1893.

Pneumonie à trente-huit ans en 1899.

Un accouchement prématuré au huitième mois.

Enfant mort quarante-huit heures après sa naissance.

Albuminurie pendant les trois derniers mois de sa première grossesse.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 12 au 15 septembre.

Albuminurie pendant la grossesse.

On trouve de l'albumine dans les urines au moment de l'accouchement.

Etat général de la femme assez satisfaisant, sauf un peu d'œdème des membres inférieurs.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.580 grammes à sa naissance et 2.450 grammes à sa sortie le huitième jour.

Placenta 320 grammes. Membranes 24/1.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXII (obs. 1186, 4 juillet 1901).

Femme F. M..., trente ans, giletière, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte phtisique à vingt-cinq ans.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à vingt-cinq ans.

Pleurésie à vingt ans en 1891.

Réglée à treize ans régulièrement.

Trois accouchements normaux à terme en 1890, 1896 et 1897. Troisième fois à Baudelocque en 1897 (obs. 1307). Enfant de 3.420 grammes. Placenta 370 grammes.

Suites de couches normales.

Quatrième grossesse se termine par un accouchement au

huitième mois en 1899 (Baudelocque, obs. 929). Enfant pesant 2.090 grammes à sa naissance. Placenta 375 grammes.

Suites de couches normales.

Des quatre enfants nourris au biberon deux sont vivants et les deux autres sont morts en bas âge (?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 13 au 17 septembre, Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.300 grammes à sa naissance et 3.880 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 640 grammes. Membranes 32/6.

Suites de couches presque normales. Température maximum 37 degrés, Un peu d'albumine dans les urines au moment de l'accouchement et dans les cinq premiers jours. Après le cinquième jour l'albumine disparaît grâce au régime lacté et l'état de la femme à sa sortie le neuvième jour est bon.

OBSERVATION CXIII (obs. 1289, 27 juillet 1901).

Femme B. L..., trente ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Parents morts tuberculeux.

Réglée à quinze ans et demi.

Antécédents personnels. — Bronchite à vingt ans.

Pleurésie sèche en 1899 à la fin de sa première grossesse.

Premier accouchement normal en 1899. Enfant nourri au biberon, mort à trois semaines.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 16 au 22 octobre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.520 grammes à sa naissance et 3.440 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 37/10.

Suites de couches normales. Température maximum 37°

Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour satisfaisant.

OBSERVATION CXIV (obs. 1532, 3 septembre 1901).

Femme H. M..., vingt-six ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à onze ans et à quinze ans.

Premier Accouchement prématuré au huitième mois.

Enfant nourri au sein maternel pendant deux mois, au biberon par une nourrice ensuite, mort à deux mois et demi.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 6 avril.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse.

Rien aux poumons.

Avortement dans le cours du cinquième mois. Enfant vivant de 770 grammes, meurt un quart d'heure après sa naissance. Placenta 300 grammes. Membranes 20/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CV (obs. 1590, 11 septembre 1901).

Femme S. M..., ménagère, VIII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à douze ans. Coqueluche à sept ans. Pleurésie gauche à trente-trois ans en 1899r Six accouchements normaux en 1888, 1891, 1892, 1893, 1896 et 1900. Une grossesse se termine par une fausse couche dans le cours du troisième mois en 1895. Cinq enfants nourris au sein maternel sont bien portants. Sixième venu avant terme en 1891, mort-né.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 11 octobre.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.166 grammes à sa naissance et 3.020 à sa sortie le neuvième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 30/7.

Suites de couches normales,

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXVI (obs. 1855, 21 octobre 1901).

Femme E. P..., vingt-deux ans, lingère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à treize et quatorze ans.

Réglée à douze ans.

Premier accouchement à huit mois en 1898. Enfant nourri au biberon, mort à quatre mois.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 4 au 8 janvier. Rien aux poumons.

Accouchement normal à terme.

Enfant pesant 3.620 grammes à sa naissance et 3.450 gr. à sa sortie le dixième jour. Placenta 770 grammes. Membranes 21/11.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXVII (obs. 1863, 22 octobre 1901).

Femme L. C..., vingt-quatre ans, confectionneuse, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt et un ans en 1898.

Réglée à dix-sept ans.

Premier accouchement normal (Baudelocque, obs. 737) en 1898. Enfant pesant 3.070 grammes à sa naissance (mis en nourrice). Placenta 480 grammes. Suites de couches normales. Température maximum 37°6 (le premier jour).

La femme sort le septième jour en bon état.

Deuxième accouchement normal en 1899. Les deux enfants nourris au biberon, bien portants. Grossesse actuelle : Dernières règles du 25 au 30 décembre.

Rien aux poumons. Accouchement normal. Enfant pesant 2.820 grammes à sa naissance et 2.970 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 390 grammes. Mensuration des membranes impossible.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXVIII (obs. 1896, 15 novembre 1901).

Femme L. C..., vingt et un ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à douze ans.

Réglée à douze ans.

Premier accouchement normal en 1899.

Enfant nourri au sein maternel pendant quinze mois, bien portant.

Grossesse actuelle: Dernières règles du 2 au 10 février. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.380 grammes à sa naissance et 3.780 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 32/12.

Suites de couches parfaites.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXIX (obs. 2176, 23 décembre 1901).

Femme P..., trente-cinq ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance. Pleurésie à vingt-quatre ans en 1890.

Réglée à dix-neuf ans, régulièrement.

Premier accouchement normal en 1898. Enfant nourri au sein maternel pendant deux mois, puis mis en nourrice, mort à deux mois et demi.

La femme s'était placée comme nourrice.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 5 février.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.510 grammes à sa naissance et 3.560 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta 530 grammes. Membranes 34/16.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION CXX (obs. 71, 14 janvier 1902).

Femme D. L..., vingt-sept ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole à six ans. Pleurésie à huit ans.

Premier accouchement normal en 1884.

Enfant nourri au biberon, bien portant. Grossesse actuelle :
Dernières règles du 8 au 13 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.300 grammes à sa naissance et 3.490 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 410 grammes. Membranes 34/8.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXXI (obs. 167, 2 février 1902).

Femme S. M..., trente ans, blanchisseuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans en 1889.

Premier accouchement normal, 1900. Enfant nourri au sein maternel pendant huit mois, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 4 mai. Etat général de la femme, bon, aux poumons inspiration rude.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.250 grammes à sa naissance et 3.240 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 450 grammes, membranes 26/11.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXXII (obs. 293, 21 février 1902).

Femme D. M..., trente-deux ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance, pleurésie à vingt ans en 1890.

Deux accouchements normaux en 1896 et 1900. Premier enfant nourri au sein maternel pendant dix-huit mois, bien portant, deuxième enfant né en état de mort apparente, mort au bout de trois jours.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 11 au 17 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 4.300 grammes à sa

naissance et 4.400 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 540 grammes. Membranes 35/9.

Suites de couches presque normales, seule élévation de température, à 37°8 et le pouls à 112, le septième jour due à une lymphangite du sein droit. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXXIII (obs. 412, 11 mars 1902).

Femme M. M..., vingt-huit ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Réglée à onze ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à douze ans, pleurésie à quatorze ans.

Premier accouchement normal en 1897 (Baudelocque, obs. 267). Enfant pesant 3.600 grammes et 3.400 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 550 grammes. Etat général de la femme bon.

Suites de couches normales.

Deuxième accouchement normal en 1898 (Baudelocque, obs. 1.064). Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.600 grammes à sa sortie, le septième jour. Placenta 510 grammes. Etat général de la femme bon.

Suites de couches normales.

Troisième accouchement normal en 1900. Premier enfant nourri au sein maternel trois mois, puis au biberon, mort à cinq mois de diarrhée. Deuxième enfant nourri au sein maternel vingt et un mois, bien portant. Troisième enfant nourri au sein maternel mort à six mois de bronchite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 15 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance et 2.600 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 590. Membranes 27/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXXIV (obs. 495, 26 mars 1902).

Femme B. M..., trente-cinq ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Antécédents personnels. — Pneumonie à treize ans. Pleurésie à dix-huit ans en 1885.

Premier accouchement normal en mars 1898 (Baudelocque, obs. 410). Enfant pesant 2.550 grammes à sa naissance et 2.770 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta, 400 gr.

Suites de couches normales. Nourri au biberon par une nourrice, enfant mort à trois mois d'entérite.

Deuxième accouchement prématuré au septième mois en 1900 (Baudelocque, obs. 1648). Enfant pesant 2.180 grammes à sa naissance et 2.000 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 430 grammes. Membranes 22/0. Etat de la femme bon.

Suites de couches normales. Enfant nourri au sein maternel d'abord, au biberon par la mère ensuite, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles, du 8 au 16 juillet.

Rien aux poumons.

Accouchement normal; enfant pesant 3.600 grammes à sa naissance et 3.400 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 610 grammes. Membranes 29/10.

Suites de couches : hémorragie après l'accouchement. Température à 37°. Pouls à 116. Hémorragie cesse après un traitement approprié.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXXV (19 avril 1902, obs. 643).

Femme F. A..., vingt-sept ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte tuberculeuse à vingt-deux ans.

Antécédents personnels. — Hémoptysie à dix-sept ans. Pneumonie à dix-neuf ans. Pleurésies à dix-neuf et vingt-cinq ans en 1899.

Rhumatisme articulaire aigu à vingt et un ans.

Premier accouchement normal au neuvième mois en 1900 (Baudelocque, obs. 2303). Son état général était alors assez satisfaisant. A l'auscultation des poumons on trouvait : respi-

ration rude saccadée aux deux sommets. Quelques frottements pleuraux à la base droite. Rien à l'auscultation du cœur. Température de 36°9. Pouls 72. Enfant pesant 3.030 grammes à sa naissance et 2.940 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta 570 grammes. Membranes 29/12.

Suites de couches : Température une seule fois était de 37°6 (lymphangite légère du sein droit). A sa sortie le onzième jour état de la femme était satisfaisant.

Enfant élevé à l'allaitement mixte par la mère, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles à la fin du mois de juillet. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Etat général satisfaisant.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.200 grammes à sa naissance et 3.150 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 28/6.

Suites de couches normales.

OBSERVATION CXXVI (19 avril 1902, obs. 648).

Femme V. A..., quarante-quatre ans, ménagère, VII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1884, fièvre typhoïde en 1891.

Réglée à treize ans et demi.

Six accouchements normaux en 1878, 1880, 1883, 1888, 1890, 1893. Des six enfants élevés au sein maternel, quatre sont vivants et bien portants, les deux autres sont morts en bas âge de méningite (?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 14 juillet.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au neuvième mois. Constatation d'un fibrome de la grosseur d'une tête de fœtus. Bassin rétréci Pr. S. P. 10 centimètres. Présentation du siège. Enfant pesant 3.500 grammes à sa naissance et 3.870 grammes à sa sortie le trente et unième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 26/8

Suites de couches : Température presque normale jusqu'au dix-huitième jour, brusquement s'élève à 40°2, le pouls à 120 pulsations.

Le vingt-deuxième jour la température redevient et reste normale jusqu'à la sortie de la femme qui quitte le service en parfait état le trente et unième jour.

OBSERVATION CXXVII (30 mai 1902, obs. 868).

Femme E..., quarante ans, repasseuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole et scarlatine dans l'enfance. Métrite en 1896. Pleurésie gauche en juillet 1899.

En 1885 avortement dans le cours du quatrième mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 6 septembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute sa grossesse, travaillant debout.

On trouvait de l'albumine dans ses urines que le régime lacté suivi pendant trois mois a fait disparaître. Etat général de la femme, bon. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.400 grammes à sa naissance et placenta 390 grammes. Membranes 29/7.

Suites de couches : une seule élévation brusque de température à 38°2 le quatrième jour. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXXVIII (obs. 903, 4 juin 1902).

Femme A. M..., vingt et un ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie à douze ans.

Réglée à quinze ans, régulièrement.

Un accouchement en 1901 au huitième mois (présentation du siège). Enfant meurt douze jours après sa naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 septembre (?).

Accouchement spontané. Présentation du siège. Enfant pesant 2.670 grammes à sa naissance et 2.770 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 400 grammes. Membranes 37/6.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXXIX (obs. 1188, 25 juillet 1902).

Femme H. N..., trente six ans. Domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Rougeole et pleurésie dans l'enfance.

Réglée à quinze ans régulièrement.

En 1890 avortement dans le cours du troisième mois à la suite d'une chute d'après la femme.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 au 28 août (?).

Un peu d'albumine dans ses urines pendant la grossesse, régime lacté. Au moment de l'accouchement les urines sont troubles. Etat général de la femme, satisfaisant, rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.850 grammes à sa naissance et 2.690 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 430 grammes. Membranes 28/12.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CXXX (obs. 1349, 2 septembre 1902).

Femme G. M..., trente-sept ans, cuisinière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1898.

Réglée dix-sept ans.

Premier accouchement normal en 1893.

Enfant nourri au sein naturel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 4 janvier, rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.350 grammes à sa naissance et mort le lendemain de sa naissance. Placenta 390 grammes. Membranes 26/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXXXI (obs. 1390, 17 septembre 1902).

Femme S. P..., vingt-quatre ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort d'une maladie chronique des poumons.

Antécédents personnels. — Rougeole, coqueluche en bas âge.

Pleurésie à neuf ans.

Réglée à douze ans et demi.

Deux accouchements normaux en 1897 et 1899, premier enfant nourri au biberon, deuxième au sein maternel. Sont vivants tous les deux.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 12 au 15 décembre, rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.330 grammes à sa naissance et 3.640 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 500 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CXXXII (obs. 1540, 12 octobre 1902).

Femme V. M..., trente-six ans et demi, blanchisseuse, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de bacillose pulmonaire.

Réglée à douze ans et demi, régulièrement.

Antécédents personnels. — Variole et pleurésie à quinze ans.

Congestion pulmonaire à vingt-quatre ans, depuis bronchite chronique.

Trois accouchements normaux en 1898, 1899 et 1901. Des trois enfants nourris au biberon, un seul est vivant et bien portant. Les deux autres sont morts en bas âge de broncho-pulmonaire.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 28 au 30 décembre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse. Etat général de la femme, satisfaisant. Sommet gauche suspect.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 5.020 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 480 grammes. Membranes 22/10.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXXXIII (30 novembre 1902, obs. 1827).

B. G..., vingt-quatre ans, infirmière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine à deux ans et demi.

Rougeole à neuf ans. Pleurésie à onze ans. Rhumatisme articulaire aigu et anémie à dix-sept ans.

En février 1902, avortement dans le cours du deuxième mois causé par une antifixion congénitale de l'utérus avec sténose du col diagnostiquée par le professeur Pinard. Le traitement indiqué : dilatation du col n'est pas suivi parce que la femme devient enceinte.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 8 au 11 février.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.670 grammes à sa naissance et 4.060 grammes à sa sortie le vingt et unième jour.

La femme sort en bon état le vingt et unième jour.

OBSERVATION CXXXIV (2 décembre 1902, obs. 1842.)

Femme B. M..., vingt-deux ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à onze ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à six ans.

Un accouchement normal en 1900. Enfant nourri au sein maternel mort à sept mois (?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 2 au 5 février.

Rien aux poumons.

Accouchement normal à terme. Enfant pesant 3.300 gr. à sa naissance et 3.520 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 620 grammes. Membranes 36/6.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXXXV. (4 janvier 1903, obs. 29).

Femme P. L..., trente-quatre ans, blanchisseuse, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à treize ans.

Quatre accouchements normaux en 1887, 1889, 1892, 1894.
Des quatre enfants nourris au sein maternel, trois sont vivants et bien portants, un est mort en bas âge de rougeole.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 8 au 12 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 3.090 grammes à sa naissance et 3.250 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 32/12.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION CXXXVI (28 janvier 1903, obs. 162).

Femme F. C., vingt-trois ans, domestique, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à onze ans et demi.

Antécédents personnels. — Rougeole et scarlatine dans l'enfance.

Pleurésie à dix-sept ans.

Deux accouchements normaux en 1899 et (?). Premier enfant nourri au biberon par la mère, bien portant. Deuxième enfant mort huit jours après sa naissance (cause ?)

Grossesse actuelle : Dernières règles du 4 au 7 mai.

La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement normal près du terme. Enfant pesant 3.720 gr. à sa naissance et 3.760 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 700 grammes. Membranes, mensuration impossible. Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CXXXVII (obs. 503, 24 mars 1903).

Femme F. L., vingt-sept ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort de bronchite à soixante et un ans.

Réglée à dix-sept ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine, rougeole, bronchite dans l'enfance. Pleurésie droite à dix-sept ans.

I. — En 1898 expulsion d'un fœtus vivant dans le cours du sixième mois. Enfant mort après quelques inspirations.

II. — En 1902 accouchement spontané à huit mois. Enfant élevé au sein maternel, mort à trois semaines de diarrhée.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 6 au 8 juillet. La femme ne s'est pas reposée. Etat général satisfaisant à l'auscultation des poumons, on trouve des frottements pleuraux à droite.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.520 grammes à sa naissance et 2.700 grammes à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 480 grammes. Membranes 28/5.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXXXVIII (obs. 614, 10 avril 1903).

Femme N. M..., trente-neuf ans, ménagère, VII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à trois ans.

Rhumatisme articulaire aigu et pleurésie à vingt ans en 1884.

Curetage sept mois après son premier accouchement.

Premier accouchement normal en août 1891. Enfant vivant.

II. — 8 septembre 1893 (clinique Baudelocque, obs. 1319). Accouchement normal. Enfant pesant 3.790 grammes à sa naissance et 3.700 grammes à sa sortie le huitième jour. Rien aux poumons, mais facies miral, œdème malléolaire et palpitations depuis l'attaque de rhumatisme.

Suites de couches normales, température maximum 37° 5
Etat de la mère bon à la sortie.

III. — 29 septembre 1894 accouchement normal dans le cours du neuvième mois (Baudelocque obs.). Enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance et 3.650 grammes à sa sortie le sixième jour.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie, satisfaisant.

IV. — 5 juin 1896 (Baudelocque) accouchement normal. Enfant pesant 3.500 grammes à sa naissance et 3.300 gr. à sa sortie le septième jour. Suites de couches normales. Etat général de la femme à sa sortie, bon.

V. — Août 1898 expulsion d'un fœtus dans le cours du troisième mois.

VI. — En février 1900 accouchement normal (Baudelocque, obs. 253). Enfant pesant 4.090 grammes à sa naissance et 4.000 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 570 gr. Délivrance artificielle. Suites de couches ; une seule élévation brusque de la température à 38°2 (le huitième jour). Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon. Tous les enfants nourris au biberon sont vivants et bien portants. Grossesse actuelle : Dernières règles du 4 au 8 juin.

Rien aux poumons ni au cœur.

Accouchement normal. Enfant pesant 4.240 grammes à sa naissance et 4.050 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 560 grammes. Mensuration des membranes impossible. Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXXXIX (14 avril 1903, obs. 637).

Femme A. C..., trente-deux ans, travaille dans l'imprimerie, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1897.

Premier accouchement normal en 1889. Enfant élevé au biberon par la mère, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 8 juillet.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.500 grammes à sa naissance et 2.610 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 28/10.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXL (9 juin 1903, obs. 986).

Femme M. J..., trente-cinq ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quinze ans.

Deux accouchements normaux en 1900 et 1902. Des deux enfants nourris au biberon par une nourrice, le premier mort à huit mois de (?) ; le deuxième vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 26 au 29 août.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.540 grammes à sa naissance et 3.700 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 700 grammes. Membranes 29/13.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXLI (28 juillet 1903, obs. 1258).

Femme I. C..., trente ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-quatre ans en 1897, ponctionnée deux fois.

Premier accouchement normal en 1900. L'enfant, nourri au biberon par une nourrice, est bien portant.

Grossesse actuelle : dernières règles, 24 au 28 novembre.

Etat général : amaigrissement et anémie depuis le début de sa dernière grossesse. Aux poumons on note une légère modification respiratoire. Œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.350 grammes à sa naissance et 2.300 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 440 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie satisfaisant.

OBSERVATION CXLII (15 octobre 1903, obs. 1724).

Femme D. L..., vingt-neuf ans, mouleuse, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Leucorrhée abondante. Pleurésie à vingt-six ans.

Deux accouchements normaux en 1898 et en 1900. Premier enfant, élevé au biberon par une nourrice, est mort à cinq mois et demi ; deuxième enfant, élevé au sein maternel, est bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 29 janvier au (?). La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.900 grammes à sa naissance et 2.960 à sa sortie le huitième jour. Placenta 430 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXLIII (17 octobre 1903, obs. 1744).

Femme A. A..., vingt-deux ans, mécanicienne, II-paré.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1902.

Premier avortement en 1902 dans le cours du troisième mois.

Dernières règles du 23-27 janvier.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané (présentation du siège). L'enfant pèse 2.950 grammes à sa naissance et 3.100 grammes à sa sortie le quatorzième jour. Placenta 580 grammes. Membranes 33/1.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le quatorzième jour, bon.

OBSERVATION CXLIV (obs. 1896, 14 novembre 1903).

Femme V. E..., vingt-trois ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à onze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1901.

En novembre 1896 avortement dans le cours du quatrième mois.

En décembre 1902 (Baudelocque, obs. 1949), accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2220 grammes à sa naissance et 2.300 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 390 grammes. Membranes, impossible à mesurer.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

Enfant, nourri au sein maternel et au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 21 février.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.000 grammes à sa naissance et le même poids le septième jour à sa sortie. Placenta 450 grammes. Membranes 34/13.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXLV (obs. 2000, 2 décembre 1903.)

R. M..., trente-trois ans, IV-pare, femme de chambre.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Antécédents personnels. — Réglée à onze ans régulièrement.

Pleurésie à dix-huit ans.

Première grossesse en 1894, accouchement normal.

Deuxième grossesse en 1897, accouchement normal.

Les enfants vivants, ont été élevés au biberon par la mère.

Troisième grossesse en 1902. Avortement dans le cours du deuxième mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 8 au 11 février.

Etat général satisfaisant.

Du côté des poumons on trouve une submatité au sommet gauche.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 3.660 grammes

à sa naissance et 3.400 grammes à sa sortie le dix-neuvième jour. Placenta 560 grammes. Membranes 33/9.

Suites de couches : Température reste normale pendant onze jours puis elle s'élève brusquement à 38°8. Le pouls à 100.

Le treizième jour la température devient normale. Le seizième jour, nouvelle élévation de température à 39°5. Le dix-septième jour la température redevient normale. Ces élévations brusques de température sont dues à des poussées de lymphangite du sein gauche. Etat de la femme à sa sortie le dix-neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CXLVI (Obs. 2038, 9 décembre 1903).

Femme P. A..., dix-neuf ans, passementière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans.

Antécédents personnels. — Rougeole à six ans, angine à dix ans. Pleurésie en janvier 1902, dyspnéique depuis.

Premier accouchement prématuré au huitième mois le 3 juin 1902. Enfant nourri au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 5 au 10 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané au huitième mois. Enfant pesant 2.020 grammes à sa naissance et 1.880 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 390 grammes. Membranes 18/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXLVII (obs. 106, 19 janvier 1904).

Femme F. S..., vingt ans, modiste, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à dix ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à onze ans. Pleurésie à dix-sept ans en 1900.

Premier accouchement normal le 4 décembre 1902 (cl. Baudelocque, obs. 1851).

Enfant pesant 3.470 grammes à sa naissance et 3.450 gr. à sa sortie le huitième jour.

Placenta 560 grammes.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

Enfant nourri par une nourrice, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} avril.

Rien aux poumons.

Deuxième accouchement normal.

Enfant pesant 3.950 grammes à sa naissance et 3.760 gr.
à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 530 grammes. Membranes 29/7.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXLVIII (obs. 127, 22 janvier 1904),

Femme F. C..., vingt-neuf ans, couturière, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Une sœur morte à trente-cinq ans de tuberculose.

Réglée à treize ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie et laryngite à vingt ans, en 1895.

Trois accouchements prématurés dans le cours du septième mois. Quatrième accouchement normal.

Les quatre enfants nés vivants meurent quelques heures après leur naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 11 juin.

La femme ne s'est jamais reposée pendant ses grossesses.

Le père de ses enfants est peintre. Il y a deux ans il avait des coliques saturnines.

La femme ne présente rien de suspect aux poumons.

Expulsion spontanée d'un enfant macéré pesant 1.080 gr.

Placenta 320 grammes. Membranes 32/15.

Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXLIX (obs. 134, 24 janvier 1904).

Femme A. E..., trente ans, couturière, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en novembre 1894.

21 septembre 1891. — Premier accouchement (application de forceps) dans le cours du neuvième mois.

Deuxième accouchement normal, 25 juin 1894 (Baudelocque obs. 998). Enfant 3.775 grammes à sa naissance et 4.000 gr. à sa sortie le septième jour. Placenta 450 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

22 avril 1896 (Baudelocque. obs. 679).

Troisième accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.750 grammes à sa naissance et 2.860 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 450 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

30 décembre 1899 (Baudelocque, obs. 2501).

Quatrième accouchement normal. Enfant pesant 3.100 gr. à sa naissance et 3.270 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 650 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

Les quatre enfants nourris au sein maternel, sont vivants et bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 11 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance, et 3.570 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 640 grammes. Membranes 32/5.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant,

OBSERVATION CL (1^{er} février 1904, obs. 168).

Femme H. M..., trente et un ans, mécanicienne, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine, pleurésie à onze ans.

Fièvre typhoïde suivie de phlébite à vingt-sept ans, opération d'un kyste de l'ovaire en 1896 (après son deuxième accouchement).

En 1894, avortement dans le cours du cinquième mois.

En 1896, accouchement prématuré du septième mois.

Enfant mort-né.

En 1898, accouchement prématuré au huitième mois.

Enfant nourri au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 avril.

Rien d'anormal aux poumons.

On constate chez la femme un rein flottant.

Pendant le dernier mois de la grossesse on trouvait de l'albumine dans ses urines.

Au moment de l'accouchement plus d'albumine.

Accouchement spontané. Enfant pesant 4.000 grammes à sa naissance et 3.900 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 750 grammes. Membranes, mensuration impossible.

Suites de couches, élévation brusque de la température à 38 degrés le troisième jour. Le quatrième jour la température redevient normale et le reste jusqu'à la sortie de la femme le dixième jour. La femme sort en bon état général.

OBSERVATION CLI (15 février 1904, obs. 232).

Femme L. E..., trente ans, cordonnière, III-pare.

Antécédents héréditaires.— Père mort tuberculeux.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels.— Pleurésie à vingt-quatre ans en 1898. Tousse depuis un an tous les hivers. Deux hémoptysies, une au début de sa pleurésie, l'autre en juin suivant.

Deux accouchements normaux en 1892 et 1895. Les deux enfants, nourris au sein maternel, bien portants.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 1^{er} au 16 mai. A l'auscultation des poumons : sommet droit en arrière souffle tubaire. Sommet gauche en arrière, craquements secs. La femme a beaucoup toussé pendant les huit premiers mois de sa grossesse, mais depuis un mois elle ne tousse plus et se porte bien. —

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.450 grammes à sa naissance et 2.640 grammes à sa sortie le huitième jour.

Placenta 340 grammes. Membranes déchirées.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CLII (14 février 1904, obs. 250).

Femme R. M..., trente ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires.— Rien à signaler. Réglée à dix-huit ans régulièrement.

Antécédents personnels.— Pleurésie en 1902, restée au lit vingt-trois jours.

Un avortement en 1898. Deux accouchements normaux en 1899 et 1901. Les deux enfants élevés au sein maternel, sont bien portants. Grossesse actuelle: Dernières règles du 3 au 7 mai. Rien aux poumons. Accouchement spontané. Enfant pesant 3.790 grammes à sa naissance et 3.760 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 700 grammes. Membranes 35/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CLIII (5 mars 1904, obs. 358).

Femme H. M..., trente-trois ans, étagère, II-pare.

Antécédents héréditaires.— Rien à signaler. Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels.— Pleurésie à vingt-sept ans en 1898.

Un avortement dans le cours du troisième mois en 1896. Grossesse actuelle: Dernières règles du 1^{er} au 4 septembre. La femme travaillait debout pendant toute la durée de sa grossesse.

Rien aux poumons. Expulsion spontanée d'un fœtus mort pesant 800 grammes. Placenta 200 grammes. Membranes 15/2. Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLIV (obs. 812, 29 juin 1904). Femme D. J..., trente-deux ans, journalière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter. Régée à treize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quatorze ans.

Deux accouchements normaux en 1891 et 1893. Premier enfant élevé au biberon par la mère, meurt à dix ans de pneumonie ; le deuxième enfant élevé au sein maternel meurt à deux ans de rougeole.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 23 au 25 septembre. Pendant la grossesse et au moment de l'accouchement on trouvait des traces d'albumine dans ses urines. Accouchement spontané. Enfant pesant 3.270 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le neuvième jour.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CLV (6 août 1904, obs. 1028).

Femme L. E..., trente-deux ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Régée à dix-neuf ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-huit ans en 1900.

Deux accouchements normaux en 1897 et 1901. Les deux enfants, élevés au sein maternel, sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 14 au 18 novembre. Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.860 grammes à sa naissance et 3.960 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta 600 grammes. Membranes 32/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION CLVI (9 août 1904, obs. 1045).

Femme L. Z..., trente-cinq ans, mécanicienne, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Régée à quinze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix ans.

Premier accouchement normal en 1886 à l'âge de seize ans et demi. Enfant élevé au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle: Dernières règles du 4 au 10 novembre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.740 grammes à sa naissance et 3.790 à sa sortie le dixième jour. Placenta 650 gr. Membranes 28/8.

Suites de couches normales, Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon,

OBSERVATION CLVII (14 août 1904, obs. 1075).

Femme E. E..., trente-trois ans, modiste, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trois ans. Rougeole à douze ans.

Deux accouchements normaux en 1899 et 1901. Des deux enfants élevés au sein maternel, un est bien portant; l'autre mort à deux mois (?).

Grossesse actuelle: Dernières règles du 1^{er} au 4 décembre.

Pendant la grossesse, des vomissements, des traces d'albumine dans les urines, rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.540 grammes à sa naissance et 2.700 grammes à sa sortie le treizième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches: le deuxième jour, élévation de température à 38 degrés et pouls à 116; le troisième jour température et pouls normaux. Etat de la femme à sa sortie le troisième jour, bon.

OBSERVATION CLVIII (18 août 1904, obs. 1096).

Femme N. B..., trente-cinq ans, papetière, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-huit ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à seize ans.

Trois accouchements normaux en 1891, 1893 et 1895. Les trois enfants nourris au sein maternel et au biberon, deux sont morts

en bas âge d'entérite et de broncho-pneumonie, le troisième vivant et bien portant.

Quatrième accouchement. Présentation du siège. Enfant mort pendant le travail. Grossesse actuelle: Dernières règles du 25 au 29 octobre. Etat général de la femme bon, rien d'anormal du côté des poumons. Accouchement normal. Enfant pesant 3.530 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie. Placenta 560 grammes. Membranes 30/12.

Suites de couches, normales. Etat de la femme à sa sortie, bon.

OBSERVATION CLIX (29 août 1904, obs. 1154).

Femme P. E..., quarante-trois ans, journalière, IX-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quinze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quarante et un ans en 1902.

Tous les accouchements précédents (entre 1883 et 1897) étaient normaux. Tous les enfants élevés au sein maternel, quatre de vivants, les autres morts en bas âge.

Grossesse actuelle: Dernières règles du 16 juin. Rien aux poumons.

C'est un avortement dans le cours du troisième mois. Dernier rapport sexuel remonte à quatre jours, depuis ce temps-là la femme perdait du sang.

Suites de couches, la femme sort le troisième jour sur sa demande. Pendant les trois jours qu'elle a passés dans le service sa température ne dépassait pas 37 degrés.

OBSERVATION CLX (18 septembre 1904, obs. 1288).

Femme R. E..., quarante-trois ans, modiste, VII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-trois ans.

Six accouchements normaux (1880, 1881, 1890, 1892, 1894, 1899). Tous les enfants élevés au sein maternel excepté le dernier qui mourut pendant l'accouchement. Premier enfant mort à neuf mois de broncho-pneumonie; deuxième enfant mort à

onze mois de méningite (?) ; les trois autres sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 au 20 janvier. Pendant la grossesse on trouvait de l'albumine dans ses urines. Pendant l'accouchement 10 grammes d'albumine.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 4.950 grammes à sa naissance et 4.960 grammes à sa sortie le dixième jour.

Suites de couches. Toujours de l'albumine qui diminue de jour en jour grâce au régime lacté. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour : on trouve 0 gr. 75 d'albumine. La femme sort sur sa demande,

OBSERVATION CLXI (25 octobre 1904, obs. 1427).

Femme C. V..., vingt-six ans, domestique, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à trente-huit ans d'affection pulmonaire.

Réglée à treize ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à seize ans.

Premier accouchement normal en 1899. Enfant élevé au sein maternel pendant deux mois, puis au biberon, bien portant.

Deuxième en 1900, avortement au cours du cinquième mois.

Troisième accouchement en 1901. Présentation du siège. Enfant mort pendant l'accouchement.

Quatrième en 1902, accouchement au cours du neuvième mois. Grossesse gémellaire, enfants morts.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 2 au 4 février.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.870 grammes à sa naissance et 3.650 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 600 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le septième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXII (5 novembre 1904, obs. 1545).

Femme F. L..., trente ans, cuisinière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

Premier accouchement au cours du quatrième mois en 1891. Eclampsie. Enfant vivant à sa naissance. Mort le lendemain.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 11 mars.

Accouchement spontané de deux enfants : l'un pesant 1.950 grammes, mort le lendemain de sa naissance ; l'autre pesant 1.980 grammes à sa naissance et 1860 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 720 grammes. Membranes 40/5.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le septième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXIII (8 novembre 1904, obs. 1564).

Femme B. R..., trente-sept ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte tuberculeuse.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchite à vingt-trois ans. Congestion pulmonaire en février 1899 pendant sa première grossesse.

Pleurésie gauche en 1899.

Trois accouchements normaux en 1899, 1900, 1901. Dernier accouchement à Baudelocque, enfant pesant 4.050 grammes.

Suites de couches normales. Premier enfant élevé au biberon, mort à quatre mois de diarrhée infantile ; deuxième enfant élevé par une nourrice, bien portant ; troisième enfant élevé au sein maternel pendant onze mois, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 28 janvier au 4 février. La femme ne s'est pas reposée, elle piquait à la machine et lavait le linge. Vomissements pendant les quatre premiers mois de sa grossesse.

Etat général de la femme assez bon.

Auscultation des poumons révèle : respiration voilée à la base gauche.

Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.100 grammes à sa naissance, mort quelques heures après. Placenta 450 grammes, membranes 26/7.

Au moment de l'accouchement on trouvait des traces d'albumine dans les urines de la femme.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXIV (6 décembre 1904, obs. 1765).

Femme G. C..., quarante ans, ménagère, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trente et un ans en 1895. Tousse depuis l'hiver. Fièvre typhoïde à trente-six ans.

Quatre accouchements normaux (en (?), 1898, 1899, 1901). Premier enfant élevé au biberon, mort à cinq mois d'entérite. Des trois autres élevés au sein maternel, deux sont morts de diphtérie à quatre ans et trois ans. Le troisième est bien portant. Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 25 mars. Rien aux poumons. Accouchement normal. Enfant pesant 3.600 grammes à sa naissance et 3.800 grammes à sa sortie le quatorzième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 28/7.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le quatorzième jour, bon.

OBSERVATION CXXV (25 décembre 1904, obs. 1812).

Femme D. J..., vingt-huit ans, couturière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à onze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole et fièvre typhoïde à quatre ans. Pleurésie à vingt-six ans en 1902. En 1901 avortement dans le cours du troisième mois. Deuxième en 1902 accouchement normal. Enfant nourri au sein maternel et au biberon, bien portant. Troisième en 1904, avortement dans le cours du deuxième mois. Grossesse actuelle : Dernières règles du 16 au 20 avril. La femme piquait à la machine et ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Accouchement spontané au neuvième mois. Enfant pesant 2.070 grammes à sa naissance et 2.080 grammes à sa sortie le neuvième jour. Il a présenté des malformations du membre supérieur. Placenta, 360 grammes. Membranes, 34/6.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant. Rien aux poumons.

OBSERVATION CLXVI (27 décembre 1904, obs. 1823).

Femme P. E..., vingt-cinq ans, blanchisseuse, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à quatorze ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1901. Trois accouchements normaux en 1900, 1901, 1903. Les enfants, élevés au sein maternel, sont tous vivants.

Grossesse actuelle : Dernières règles (?). Rien aux poumons. Accouchement spontané d'un enfant pesant 3.440 grammes à sa naissance et 3.250 à sa sortie le sixième jour. Placenta 390 grammes. Membranes 33/12.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION CLXVII (5 janvier 1905, obs. 24).

Femme M. C..., vingt-quatre ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort pleurétique à cinquante-huit ans. Mère morte ascitique à cinquante-cinq ans.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Bronchites répétées à partir de dix ans. Pleurésie droite avec épanchement à vingt-trois ans en 1904.

Un accouchement à terme. Présentation du siège. Enfant mort pendant la période d'expulsion.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 7 au 10 mars, hémorragie au cinquième mois de sa grossesse pendant huit jours.

À l'auscultation des poumons on trouve à droite et en arrière une inspiration rude, soufflante et une expiration prolongée, submatité. Bassin rétréci. Utérus bicorné.

Accouchement spontané. Présentation du siège. Enfant pesant 3.350 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 500 grammes.

Suites de couches : deuxième jour la température monte à 38 degrés et le pouls à 100. Troisième jour la température et

le poulx redeviennent normaux et le restent jusqu'à la sortie de la femme le huitième jour.

OBSERVATION CLXVIII (18 janvier 1905, obs. 63).

Femme P. E..., vingt-quatre ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à dix ans et demi régulièrement. Pleurésie à dix-huit ans en 1899.

Un accouchement en 1901 (application de forceps). Enfant élevé au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 14 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 3.500 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 33/2.

Suites de couches presque normales. Température maximum 37°8 (huitième jour). Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXIX (23 janvier 1905, obs. 108).

Femme V. A..., vingt-deux ans, cuisinière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans en 1903.

Un accouchement normal en 1901. Enfant élevé au biberon par une nourrice, mort d'entérite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 15 avril.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané : Enfant pesant 3.440 grammes à sa naissance et 3.550 grammes à sa sortie le dix-neuvième jour. Placenta 480 grammes. Membranes 25/17.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie de la clinique le dix-neuvième jour, bon.

OBSERVATION CLXX (17 mars 1905, obs. 405).

Femme L. M..., vingt-neuf ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quinze ans.

Deux accouchements normaux en 1900 et 1903. Les deux enfants élevés, au biberon, sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 21 au 26 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané : Enfant pesant 2.400 grammes à sa naissance et 3.120 à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 530 grammes. Membranes 34/6.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXI (7 avril 1905, obs. 549).

D. A..., vingt-huit ans, confectionneuse, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à quarante-deux ans, mère morte à quarante-six ans bacillaires.

Six sœurs et frères morts dont deux tuberculeux.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1904 (a duré deux mois).

Depuis cette époque la femme tousse de plus en plus.

Trois accouchements normaux en 1898, 1899 et 1902. Des trois enfants le premier, élevé au biberon, bien portant ; le deuxième, mort quatre jours après sa naissance ; le troisième, élevé au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 26 au 29 juillet.

Etat général de la femme mauvais, elle présente un état de maigreur extrême, perte des forces totale. Les quinze derniers jours de sa grossesse la femme a été obligée de garder le lit.

A l'auscultation des poumons on constate : à droite des râles sous-crépitanants disséminés dans la moitié supérieure du poumon. A gauche : on relève des signes cavitaires au niveau du bord interne de l'épine de l'omoplate et quelques frottements pleuraux, reliquats de son ancienne pleurésie. Dyspnée assez violente. Voix éteinte révélant la tuberculose laryngée. T. 37°2.

P. 400.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.000 grammes à sa naissance et 1830 le troisième jour. Allaitement artificiel.

Suites de couches pathologiques.

Premier jour T. 39°2. P. 116. Deuxième jour T. 39°5. P. 124. Troisième jour la femme est transportée à l'infirmierie de la maternité où elle meurt le 11 avril 1905.

OBSERVATION CLXXII (27 mai 1905, obs. 800).

Femme C. R..., trente-cinq ans, couturière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien de particulier.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Variole à sept ans, pleurésie à trente-quatre ans en 1904.

Trois accouchements normaux en 1896, 1900 et 1902. Des deux premiers enfants, nourris au biberon, un est mort à neuf mois de bronchite, l'autre est bien portant. Le troisième enfant, élevé au sein maternel, est bien portant.

Grossesse actuelle : dernières règles du 10 au 15 août.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 3.100 grammes à sa naissance et le même poids à sa sortie le huitième jour. Placenta 400 grammes. Membranes 26/8. Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CLXXIII (17 juin 1905, obs. 919).

Femme D. M..., trente-six ans, masseuse, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à quarante-cinq ans de congestion pulmonaire. Une sœur morte à vingt-quatre ans de congestion pulmonaire.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleuro-pneumonie à trente et un ans en 1900, péritonite à vingt-quatre ans.

Deux accouchements normaux en 1887 et en 1891. Les deux enfants, nourris au biberon par la mère, sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 15 septembre.

Rien aux poumons.

Accouchement spontané.

Enfant pesant 3.350 grammes à sa naissance et 3.590 gr.
à sa sortie le neuvième jour.

Placenta 500 grammes. Membranes 24/10.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXIV (28 juin 1905, obs. 980).

Femme R. M..., quarante-deux ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine à neuf ans.

Jaunisse à dix-sept ans, depuis subictère des conjonctives.

Pleurésie en octobre 1904.

En 1893 expulsion d'un enfant macéré dans le cours du huitième mois. Eclampsie du travail. Deuxième accouchement en septembre 1900 (obs. 1698, Baudelocque). Enfant de 2.300 gr. Placenta 380 grammes.

Albuminurie dans les suites de couches.

Troisième en 1903, avortement dans le cours du deuxième mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 12 septembre.

Hémorragie assez abondante du 6 au 8 octobre.

Etat général de la femme assez bon.

Un peu d'œdème des membres inférieurs.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.450 grammes à sa naissance et 2.320 grammes à sa sortie le dixième jour.

Placenta 450 grammes. Membranes 30/6.

Suites de couches presque normales.

Dans les premiers jours on retrouve les traces d'albumine dans les urines.

Le dixième jour à sa sortie état de la femme bon.

OBSERVATION CLXXV (Obs. 1048, 10 juillet 1905).

Femme L. L..., vingt-six ans, couturière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix ans.

Scarlatine à quatorze ans.

Trois accouchements normaux (1898, 1901 et 1903). Les deux premiers enfants nourris au sein maternel sont vivants. Le troisième nourri au biberon est mort à deux ans de broncho-pneumonie.

Grossesse actuelle : Dernières règles de la fin d'octobre. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.900 grammes à sa naissance et 2.890 grammes à sa sortie le huitième jour.

Placenta de 380 grammes. Membranes 33/8.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXVI (Obs. 1174, 2 août 1905).

Femme P. M..., trente-trois ans, domestique, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte de pneumonie. Régée à quinze ans.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à sept ans. Pleurésie à vingt-sept ans, en 1899.

Premier accouchement normal en 1894. Enfant mort huit jours après sa naissance.

Deuxième accouchement prématuré dans le cours du septième mois. Enfant mort cinq jours après sa naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 18 au 21 octobre. Pendant la grossesse des pertes blanches abondantes.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.870 grammes à sa naissance et 2.750 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 420 grammes. Membranes 15/6. Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXVII (29 octobre 1905, obs. 1595).

Femme E. E..., ménagère III-pare.

Antécédents héréditaires. — Un frère mort tuberculeux.

Régée à quatorze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à quatorze ans.

Bronchite en octobre 1902.

Premier accouchement normal en 1902.

Deuxième accouchement au neuvième mois.

Les deux enfants, nourris au sein maternel pendant onze mois, sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 24 janvier.

Accouchement normal, Enfant pesant 3.250 grammes à sa naissance et 3.100 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 35/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie, bon.

OBSERVATION CLXXVIII (5 mars 1906, obs. 410).

Femme J. V..., vingt-neuf ans; infirmière II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à vingt-trois ans.

Pleurésie il y a deux mois.

En 1904, accouchement spontané à terme. Enfant nourri par une nourrice, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles 18 au 22 juin.

Pleurésie au septième mois de sa grossesse, soignée à Cochin dans le service de M. Schwartz. Epanchement dans la plèvre gauche. Ponction exploratrice relève du liquide louche. Elévation de température des premiers jours. Amaigrissement, toux. Alitée pendant deux mois.

Etat général de la femme au moment de l'accouchement, satisfaisant.

Accouchement normal. Enfant pesant 4.000 grammes à sa naissance et 4.230 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 22/3.

Suites de couches normales. Le deuxième jour seulement poulx à 100. Etat de la mère à sa sortie, bon.

OBSERVATION CLXXIX (15 mars 1906, obs. 475).

Femme D. R..., quarante ans, ménagère, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à soixante et un ans de pleurésie.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à dix ans. Pleurésie double en 1899. Restée à l'hôpital pendant quatre mois. Pneumonie gauche à trente et un ans.

Premier accouchement spontané au huitième mois (Baudelocque, obs. 799 de 1900). Enfant pesant 1.930 grammes. Suites de couches normales. Etat de la mère satisfaisant.

L'enfant nourri au sein maternel meurt à sept mois de broncho-pneumonie.

Deuxième accouchement, prématuré, dans le cours du septième mois (Baudelocque, 25 août 1901, obs. 1477). Etat de la mère satisfaisant.

Expulsion d'un œuf complet pesant 650 grammes.

Suites de couches normales. Température maximum 37°. Sortie de la mère en bon état.

Troisième accouchement, 5 octobre 1902 (Baudelocque, obs. 1501). Dernières règles, 18-20 janvier. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.340 grammes à sa naissance et 2.150 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 420.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie, satisfaisant. Enfant vivant.

Quatrième accouchement, 25 juillet 1904 (Baudelocque, obs. 960). Cette femme qui ne s'est pas reposée pendant sa grossesse et a eu un dernier rapport le 23 juillet, expulse un produit de conception pesant 2.350 grammes et un placenta de 410 grammes. Membranes 30/7. L'enfant pèse à sa sortie 2.360 grammes le neuvième jour. L'état général de la femme est bon. Rien aux poumons.

Suites de couches normales. Température maximum 37°5. Sortie le neuvième jour en parfait état. Enfant mort d'entérite. 15 mars 1906 (Baudelocque, obs. 473).

Pendant la grossesse, albumine dans les urines. Traces d'albumine seulement au moment de l'accouchement. L'état général de la femme est satisfaisant. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 1.880 grammes à sa naissance et 1.790 grammes à sa sortie le douzième jour. Placenta de 420 grammes.

Suites de couches normales. Une seule fois, température à 38 degrés. Pouls 80 le neuvième jour. La femme sort de la clinique le douzième jour en bon état.

OBSERVATION CLXXX (20 juillet 1906, obs. 1220).

B. M..., trente-cinq ans, gilette, VI-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte tuberculeuse. Régée à quatorze ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans, en 1891. Fièvre typhoïde à vingt-huit ans.

Cinq accouchements normaux (1890, 1895, 1897, 1899, 1901). Tous les enfants sont élevés au biberon : trois enfants sont vivants, les deux autres sont morts en bas âge de bronchite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 au 19 février. Rien d'anormal aux poumons.

Expulsion d'un œuf complet pesant 120 grammes dans le cours du quatrième mois (spécificité probable).

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXI (2 août 1906, obs. 1297).

Femme R. M..., vingt-huit ans. Confectionneuse, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à quarante-deux ans de tuberculose pulmonaire.

Régée à douze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans en 1898 (pas de ponction).

Premier accouchement normal en 1899. Enfant nourri au sein maternel et au biberon. Mort à neuf mois d'entérite.

Deuxième accouchement au huitième mois. Enfant mort pendant le travail.

Grossesse actuelle : dernières règles du 17 au 18 décembre. Rien aux poumons.

Accouchement spontané au huitième mois (présentation du

siège). Enfant pesant 2.950 grammes à sa naissance et 2.990 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 460 gr. Membranes 28/10.

Suites de couches normales 37°2. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXII (11 août 1906, obs. 1356).

Femme R. M..., trente et un ans. Imprimeuse. III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à dix-huit ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à deux ans et demi.

Lupus érythémateux au niveau du nez à vingt ans.

En juillet 1903 avortement dans le cours du deuxième mois.

Deuxième accouchement normal le 17 mars 1904. Enfant nourri au sein maternel et au biberon. Bien portant.

Grossesse actuelle : dernières règles du 24 au 28 octobre. Rien aux poumons.

Avortement dans le cours du troisième mois en deux temps. Délivrance artificielle. Température 39°9, pouls 120.

Suites de couches : Les deux premiers jours la température oscille entre 39°9 et 38 degrés et le pouls entre 120 et 100. Le troisième jour la température et le pouls deviennent normaux et restent tels jusqu'à la sortie de la femme le huitième jour. Etat de la femme à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXXIII (Obs. 1448, 30 août 1900).

Femme M. E..., vingt-quatre ans, femme de ménage, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Fluxion de poitrine à neuf ans. Pleurésie à douze ans.

Premier accouchement normal, en juillet 1904. Enfant élevé au sein maternel pendant dix-huit jours, mort à cet âge de broncho-pneumonie.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 19 au 21 novembre. Vomissements et épistaxis jusqu'au sixième mois de sa grossesse.

Etat général satisfaisant. Rien aux poumons.

Deuxième accouchement spontané. Enfant pesant 3.450 gr. à sa naissance et 3.580 grammes à sa sortie le huitième jour. Le placenta 480 grammes. Membranes 39/4.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXIV (Obs. 1556, 14 septembre 1906).

Femme L. J..., vingt-quatre ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte tuberculeuse.

Réglée à treize ans et demi irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

Premier accouchement normal le 10 juillet 1904. Enfant élevé au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 14 juillet. Etat général de la femme satisfaisant. Rien d'anormal du côté des poumons.

Avortement dans le cours du troisième mois.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CLXXXV (Obs. 1651, 30 octobre 1906).

Femme R. B..., vingt-huit ans, ménagère, VI-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans en 1898.

Cinq accouchements normaux en 1896, 1897, 1899, 1901, 1904.

Les quatre premiers enfants sont élevés au biberon, le premier seul est vivant, les autres morts en bas âge, le cinquième enfant nourri au sein maternel est vivant et bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 3 janvier, rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.050 grammes à sa naissance et 3.080 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 550 grammes. Membranes : 33/7.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXVI (Obs. 1812, 2 novembre 1906).

Femme C. L..., vingt-quatre ans, emballeuse, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix ans.

Premier accouchement normal le 17 juin 1900. Enfant nourri au sein maternel, vivant.

Deuxième avortement dans le cours du troisième mois en 1901.

Troisième accouchement normal au neuvième mois le 5 novembre 1902. (Baudelocque, obs. 1677). Enfant pesant 2.950 grammes à sa naissance et 3.130 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 410 grammes. Membranes 33/13. La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse.

Suites de couches normales. La femme sort du service le douzième jour dans un état générale bon. Enfant nourri au sein d'une nourrice, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 26 au 29 janvier, rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.600 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 530 grammes. Membranes 34/11.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXVII (Obs. 1884, 15 novembre 1906).

V. B..., trente-six ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort cardiaque.

Une sœur morte à vingt-deux ans de tuberculose.

Réglée à seize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trente ans en 1900.

Premier accouchement à terme (application de forceps).

Enfant nourri au biberon, mort à quatre mois de diarrhée.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 9 au 12 février. Un peu d'albumine dans ses urines pendant la grossesse, des traces au moment de l'accouchement.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.320 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta 480. Membranes 28/0.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour bon.

OBSERVATION CLXXXVIII (28 novembre 1906, obs. 1940).

L. M..., vingt-deux ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en juillet 1906.

Premier accouchement normal en 1905. Enfant nourri au sein maternel vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 août. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Rien aux poumons.

Expulsion spontanée d'un fœtus le 23 novembre dans le cours du troisième mois de sa grossesse. La femme arrive à la clinique le 25 novembre. On lui fait l'extraction digitale d'un placenta de 48 grammes. La femme a un frisson. Température 39 degrés. Pouls 136. Deuxième jour, la température et le pouls deviennent normaux.

Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CLXXXIX (2 décembre 1906, obs. 1980).

M. M..., vingt-trois ans, compositrice en imprimerie, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort tuberculeux.

Réglée à douze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie le 13 septembre 1906.

Premier accouchement normal en 1902. Enfant vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 17 au 20 mai. Pertes sanglantes peu abondantes depuis deux mois.

Etat général de la femme satisfaisant. A l'auscultation des poumons on trouve au tiers moyen du poumon droit des frottements pleuraux.

Expulsion spontanée d'un fœtus mort pesant 1.000 grammes, suivie presque aussitôt de celle du placenta Châteaubriand pesant 370 grammes. Membranes (?). Caduque épaissie.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXC (4 décembre 1906, obs. 1992).

Femme M. A..., trente et un ans, cuisinière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-quatre ans en 1899.

Premier accouchement au neuvième mois en décembre 1899. Enfant élevé au biberon, bien portant.

Deux accouchement normaux en 1900 et 1902. Les deux enfants sont bien portants, un nourri au biberon, l'autre au sein maternel.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 24 au 27 février. Dernier rapport sexuel remonte à 4 jours, rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 2.710 grammes à sa naissance et 2.900 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 380 grammes. Membranes 25/7.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, bon.

OBSERVATION CXCI (16 décembre 1906, obs. 2064).

S. P..., trente-deux ans, femme de ménage, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à douze ans et demi.

Antécédents personnels. — Rougeole à sept ans. Pleurésie à dix-huit ans en 1882.

Trois accouchements normaux en 1897, 1899, 1902. La quatrième grossesse se termine par un avortement dans le cours du troisième mois. Les trois enfants élevés au sein maternel sont vivants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 13 au 15 juin. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Elle avait des pertes de sang peu abondantes à la fin d'octobre et une forte hémorragie du 16 au 21 novembre, rien aux poumons. Expulsion spontanée d'un fœtus pesant 520 grammes. Placenta 200 grammes. Membranes 19/1.

Suites de couches : La température qui, au moment de l'entrée de la femme dans le service était de 37°4, oscille autour de 38 degrés jusqu'au septième jour où elle devient normale, le pouls qui était à 100 à l'entrée reste élevé au-dessus de 100 pendant le même temps et diminue de fréquence en même temps que la température. La femme sort le treizième jour en bon état général.

OBSERVATION CXCH (29 décembre 1906, obs. 2137).

L. J..., vingt-cinq-ans. peaussière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en septembre 1906.

Deux accouchements normaux en 1899 et 1902.

Les deux enfants élevés au sein maternel et au biberon sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 8 avril. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.450 grammes à sa naissance et 2.470 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 31/10.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

OBSERVATION CXCHII (7 février 1907, obs. 219).

F. L..., vingt-deux ans, matelassière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à quarante-deux ans de pneumonie. Un frère mort à vingt-six ans de bronchite.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-sept ans.

Deux avortements au cours du quatrième mois en 1903 et 1904 (cause inconnue).

Troisième accouchement normal en 1906. Enfant élevé au sein maternel, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 1^{er} au 6 juin. Dernier rapport sexuel, la nuit avant l'accouchement.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.800 grammes à sa naissance et 2.850 grammes à sa sortie, le sixième jour. Placenta 450 grammes. Membranes déchirées.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, bon.

OBSERVATION CXCV (18 février 1907, obs. 293.)

J. J..., quarante ans, employée de commerce, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance. Pleurésie en 1899, à trente-deux ans.

Premier accouchement normal en 1897. Enfant élevé au biberon, mort à trois mois.

Deuxième accouchement prématuré au septième mois en 1899. Enfant mort-né.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 5 au 9 septembre. Rien aux poumons.

Expulsion dans le cours du cinquième mois d'un fœtus mort pesant 520 grammes. Placenta 160 grammes. Membranes impossibles à mesurer. Caduque épaissie.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXCV (1^{er} mars 1907, obs. 349).

F. B..., vingt-huit ans, femme de ménage, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à dix-sept ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-sept ans, 1906.

Premier accouchement normal en 1903. Enfant élevé au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 15 au 23 juin. Rien aux poumons.

Accouchement spontanée. Enfant pesant 3.250 grammes à sa naissance et 3.230 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 430 grammes. Membranes 31/13. Suites de couches normales.

Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXCVI (17 mars 1907, obs. 444).

Femme C. M..., vingt-sept ans. Ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix ans.

Trois accouchements normaux (1901-1902-1903).

Les trois enfants nourris au sein maternel sont vivants.

Grossesse actuelle: Dernières règles du 1^{er} au 3 juin. Rien aux pouds.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 3.180 grammes à la naissance et 3.300 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 480 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CXCVII (8 avril 1907, obs. 567).

R. A..., trente-sept ans, couturière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à vingt-huit ans de tuberculose.

Réglée à treize ans.

Antécédents personnels. — Rougeole, variole, scarlatine dans l'enfance. Pleurésie double en 1898. Deux accouchements normaux en 1893 et 1897. Des deux enfants élevés au biberon le premier est mort à vingt mois, le deuxième est bien portant. Le troisième grossesse se termine par expulsion du produit de conception dans le cours du troisième mois en 1895.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 18 au 23 juin. Des traces d'albumine pendant la grossesse et au moment de l'accouchement.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.170 grammes à sa naissance et 2.020 grammes à sa sortie le quatrième jour (mis en nourrice). Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXCVIII (4 juillet 1907, obs. 1053).

D. M..., vingt-neuf ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans en 1898.

Trois grossesses se terminent par expulsion de fœtus macérés dans le cours du huitième mois (1897, 1899 et 1901).

Quatrième accouchement normal en 1903 (Baudelocque, obs. 1015). Enfant pesant 3.240 grammes à sa naissance et 3.270 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 680 gr.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

Cinquième accouchement normal en 1905 (Baudelocque, obs. 1408). Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.730 grammes à sa sortie le dixième jour.

Suites de couches normales. Placenta 610 grammes. Etat de la femme satisfaisant le douzième jour.

Les deux enfants élevés au sein maternel et au biberon sont morts de broncho-pneumonie en bas âge.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 24 au 29 septembre. Albumine dans les urines pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement. Rien aux poumons. Application de forceps. Enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance et 3.640 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 630 grammes. Membranes 28/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CXCIX (6 août 1907, obs. 1296).

M. M..., vingt-huit ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à trente-sept ans, bacillaire.

Antécédents personnels. — Pleurésie à seize ans.

Premier accouchement normal en 1902. Deuxième accouchement au cours du huitième mois en (?). Premier enfant nourri au biberon, bien portant. Deuxième élevé à l'allaitement mixte, mort à huit mois (de ?).

Grossesse actuelle : Dernières règles du 16 au 19 novembre. Quelques traces d'albumine pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant

2.500 grammes à sa naissance et 2.580 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 320 grammes. Membranes 30/8.

Suites de couches : une seule élévation de température à 38 degrés et pouls à 100 le deuxième jour. Le troisième jour la température et le pouls deviennent normaux et restent tels jusqu'à la sortie de la femme le dixième jour. Son état général est satisfaisant.

OBSERVATION CC (1^{er} septembre 1907, obs. 1384).

Femme M. L..., vingt-quatre ans, lingère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à onze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à seize ans,

Premier accouchement normal en 1901. Enfant élevé au biberon, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 26 au 30 novembre. Dernier rapport sexuel, la veille de l'accouchement.

Accouchement spontané de deux enfants. Premier pesant 2.300 grammes à sa naissance et 2.080 grammes à sa sortie le sixième jour. Deuxième pesant 3.200 grammes à sa naissance et 2.870 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta unique pesant 800 grammes.

Suites de couches normales. La femme sort le sixième jour, dans un état satisfaisant.

OBSERVATION CCI (11 septembre 1907, obs. 1424).

E. J..., trente ans, ménagère, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en 1903.

En 1896, avortement dans le cours du quatrième mois.

En mai 1896, accouchement normal. Enfant mort à cinq ans de méningite.

En 1899, accouchement prématuré au huitième mois. Enfant mis en couveuse mort au bout de dix jours.

Le père de ces trois enfants, alcoolique.

En 1904, accouchement normal (Baudelocque, obs. 708).

Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 3.220 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 570 grammes. Suites de couches normales. Enfant élevé au biberon, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 9 au 13 novembre.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.350 grammes à sa naissance et 3.200 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 30/10.

Suites de couches normales. Etat général de la femme, à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCII (2 novembre 1907, obs. 706).

D. L..., vingt-huit ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. Pleurésie à onze ans.

Premier accouchement normal en 1903. Enfant élevé au sein maternel, mort de coqueluche à quatorze mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 22 au 28 mars. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse. Céphalées, douleur épigastrique. Troubles de vue pendant tout le mois d'octobre. Au moment de l'accouchement 1 gramme d'albumine dans ses urines. Œdème considérable des membres inférieurs. Rien aux poumons.

Expulsion spontanée d'un fœtus macéré pesant 1.070 gr. Placenta 320 grammes. Foyers hémorragiques anciens et récents.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le quatorzième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCIII (13 novembre 1907, obs. 1772).

S. A..., vingt-sept ans, caissière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à onze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole et scarlatine dans l'enfance. Pleurésie droite en 1905 (septembre et octobre).

Premier accouchement au neuvième mois en 1905. Enfant mort à quinze mois de bronchite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 26 au 28 février. Etat général de la femme bon. A l'auscultation des poumons on trouve des frottements pleuraux à la base droite. Rien aux sommets. Accouchement au neuvième mois. Enfant pesant 2.510 grammes, mort-né. Mort de l'enfant causée par progradation et compression du cordon. Placenta 480 grammes. Membranes 33/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CCIV (20 novembre 1907, obs. 1816).

G. M..., vingt-cinq ans, culotière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à neuf ans. Pneumonie et pleurésie à onze ans.

Premier accouchement normal en décembre 1905 (Baudelocque, obs. 1864). Enfant pesant 3.220 grammes à sa naissance et 2.830 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 470 grammes.

Suites de couches normales. Enfant nourri au sein maternel vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 13 au 17 février. Rien aux poumons. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance et 3.440 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 500 grammes.

Suites de couches normales. La femme sort le huitième jour dans un bon état.

OBSERVATION CCV (23 novembre 1907, obs. 1838).

G. V..., vingt-neuf ans, infirmière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à soixante-dix ans, d'affection pulmonaire.

Réglée à quatorze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Fièvre typhoïde à vingt-quatre ans.

Pleurésie en 1906 (ponction positive).

Premier accouchement normal en 1903. Enfant élevé au biberon par la mère, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du commencement de mai. Etat général de la femme, mauvais. Amaigrissement considérable depuis trois mois. Il y a un mois elle avait eu une hémoptysie. Température 38 degrés, pouls 112. A l'auscultation des poumons, lésions bacillaires des deux sommets. Souffle intense à la base gauche.

Accouchement spontané au septième mois. Enfant pesant 2.200 grammes à sa naissance, mort quatre jours après. Placenta 300 grammes. Membranes 32/6.

Suites de couches : Les onze jours que la femme reste à la clinique sa température oscille entre 40°2 et 38 degrés. Le pouls entre 132 et 124. Le onzième jour la femme est transportée à l'infirmerie de la Maternité où elle meurt le 17 décembre de tuberculose pulmonaire.

OBSERVATION CCVI (obs. 1922, 7 décembre 1907).

S. M..., trente-quatre ans, ménagère, IX-pare.

Antécédents héréditaires.— Rien à signaler.

Réglée à treize ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels.— Pleurésie à vingt-neuf ans en 1902.

La première grossesse se termine en 1894 par expulsion dans le cours du sixième mois d'un fœtus macéré ; sept accouchements normaux en 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 et 1906. Tous les enfants sont élevés au biberon. Deux sont vivants, les autres sont morts d'entérite ou de broncho-pneumonie en bas âge.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 27 février.

Accouchement spontané. Présentation de la face. Enfant pesant 3.880 grammes à sa naissance et 3.840 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 520 grammes. Membranes 38/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCVII (obs. 2005, 20 décembre 1907).

E. E. . ., vingt-neuf ans, blanchisseuse, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole et oreillons dans l'enfance. Pleurésie à huit ans.

Premier accouchement normal en 1905. Enfant élevé au biberon, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 25 au 29 mars. Le dernier rapport sexuel remonte à quatre jours. Rien d'anormal aux poumons.

Accouchement au neuvième mois. Enfant pesant 3.080 gr. à sa naissance et 3.040 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 570 grammes. Membranes 29/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

Etat général de la femme : bon ; rien d'anormal à l'auscultation des poumons,

OBSERVATION CCVIII (20 décembre 1907, obs. 2009).

B. H. . ., trente-deux ans, teinturière, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à trente-huit ans, d'affection pulmonaire.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine à sept ans. Pleurésie à trente et un ans en 1906.

Trois accouchements en 1897, 1900 et 1903. Premier enfant vivant. Les deux autres enfants morts en bas âge.

Grossesse actuelle : dernières règles, du 15 au 20 mars.

Rien d'anormal aux poumons. Enfant pesant 3.050 gr. à sa naissance et 3.110 grammes à sa sortie le quinzième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 34/4.

Suites de couches normales jusqu'au sixième jour.

A cette date une lymphangite légère du sein gauche d'abord et une lymphangite plus forte du sein droit ensuite provoquent des élévations de température le sixième, neuvième, onzième et quinzième jour.

La température maximum atteinte fut 39 degrés le quinzième jour.

La femme sort de la clinique sur sa demande le dix-septième jour.

OBSERVATION CCIX (27 décembre 1907, obs. 2042).

E. M..., vingt ans, brodeuse, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à sept ans.

Premier accouchement normal en 1905.

Enfant élevé au sein maternel et au biberon, mort d'entérite à neuf mois. La deuxième grossesse se termine par un avortement dans le cours du troisième mois en 1906. Curettage dans les suites de couches.

Grossesse actuelle : dernières règles, du 25 au 28 février. Rien aux poumons.

Accouchement normal.

Enfant pesant 3.050 grammes à sa naissance et 3.400 gr. à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 56/3.

Suites de couches presque normales. Une seule élévation de température à 38°4 et le pouls à 108 le quatrième jour. La femme sort le neuvième jour dans un état satisfaisant.

OBSERVATION CCX (27 décembre 1907, obs. 2077).

L. L..., vingt-deux ans, cuisinière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie en juillet 1906.

Premier accouchement normal en 1906. — Enfant mort pendant le travail.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 6 au 10 mars. Etat général de la femme satisfaisant. A l'auscultation des poumons on trouve des frottements pleuraux.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.100 grammes à sa

naissance et 3.250 grammes à sortie le dixième jour. Placenta 520 grammes.

Suites de couches, une seule élévation brusque de température 38°6 et du pouls 108 le troisième jour.

Cette élévation de température est due à une légère lymphangite du sein gauche.

La femme sort le dixième jour en bon état général.

OBSERVATION CCXI (12 janvier 1908, obs. 80).

J. L..., vings-sept ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à dix-sept ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie gauche à quinze ans.

Premier accouchement au neuvième mois en 1906. Enfant élevé au biberon, vivant.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 8 au 12 avril. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.650 grammes à sa naissance et 3.380 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 450. Membranes 32/14. Suites de couches normales. Température maximum 36°8. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon,

OBSERVATION CCXII (24 février 1908, obs. 341).

B. E..., vingt-trois ans, cuisinière, I-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à signaler.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à huit ans.

Premier accouchement normal en 1902. Enfant élevé au sein maternel, vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 10 au 15 mai. La femme ne s'est pas reposée pendant sa grossesse.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.470 grammes à sa naissance et 3.490 grammes à sa sortie le douzième jour. Placenta 470 grammes. Membranes 33/3.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le douzième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXIII (27 février 1908, obs. 369).

B. L..., vingt ans, infirmière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à cinquante ans, de bacillose. Trois sœurs mortes en bas âge, dont deux de méningite.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Rhumatisme articulaire aigu à dix-sept ans. Pleurésie à dix-huit ans, en 1906.

En 1907, avortement dans le cours du troisième mois.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 30 novembre au 7 décembre. La femme arrive à la clinique disant qu'elle a expulsé un fœtus et le placenta. Le toucher permet de reconnaître la présence de débris dans la cavité utérine. La température est de 37°5, le pouls est à 120.

On introduit un ballon de Champtier et après son expulsion, M. Eudes extrait les membranes adhérentes et ne trouve pas de débris placentaires.

Le lendemain, température 37°6, pouls 92. A partir de ce moment la température normale.

Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION CCXIV (8 mars 1908, obs. 416).

S. J..., vingt-cinq ans, ménagère, II-pare.

Antécédents personnels. — Rien à signaler.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents héréditaires. — Pleurésie à vingt ans, en 1905.

Premier accouchement normal en 1906. Enfant élevé au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : dernières règles du 20 au 24 mai.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.770 grammes à sa naissance et 3.250 grammes à sa sortie le sixième jour.

Placenta 450 grammes. Membranes 40/2.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXV (6 avril 1908, obs. 594).

Femme M. M..., vingt-neuf ans, infirmière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-sept ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole à dix-neuf ans. Pleurésie sèche à vingt ans, en 1899.

Premier accouchement normal au neuvième mois, le 2 janvier 1905. (Cl. Baudelocque, obs. 9.) Enfant pesant 2.820 grammes à sa naissance et 2.680 à sa sortie le septième jour. Placenta 300 grammes. Membranes 25/3.

Suites de couches normales. Etat général de la femme à sa sortie le septième jour, bon.

Enfant nourri au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 26 juin.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.500 grammes à sa naissance et 3.370 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 570 grammes. Membranes 3 2/2.

Suites de couches normales.

Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CCXVI (26 mai 1908, obs. 897).

M. B..., vingt ans, dactylographe, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

En 1905, expulsion d'un fœtus macéré.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 24 au 28 septembre. Petite hémorragie il y a quinze jours. Rien aux poumons.

Expulsion spontanée d'un fœtus macéré pesant 1.620 gr. et d'un placenta de 820 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXVII (6 juillet 1908, obs. 1132).

C. A..., trente-quatre ans, lingère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans.

Antécédents personnels. — Pleurésie à douze ans. Diphtérie à vingt-trois ans.

Deux accouchements normaux en 1899 et 1901. Les deux enfants élevés au sein maternel sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 23 septembre. Des petites hémorragies pendant la grossesse. Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 4.000 grammes à sa naissance et 3.750 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta, 470 grammes. Caduque épaissie.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour satisfaisant.

OBSERVATION CCXVII (9 juillet 1908, obs. 1152).

P. Z., vingt-sept ans, ménagère, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à onze ans.

Premier accouchement normal en 1906, d'un enfant mort-né. La femme présentait de l'albumine dans ses urines pendant sa première grossesse.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 19 au 25 septembre, De l'albumine dans les urines pendant la grossesse. Au moment de l'accouchement, pas d'albumine.

Etat général de la femme, bon.

Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance et 3.140 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 700 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXIX (14 juillet 1908, obs. 1881).

R. E., trente-six ans, domestique, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt ans, en 1892,

Quatre grossesses précédentes, se terminant par expulsion des fœtus dans le cours du sixième, septième, deuxième et quatrième mois (en 1902-1903-1904).

Pendant la première grossesse, albumine dans les urines en grande quantité.

Les enfants meurent quelques heures après la naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 4 au 6 novembre.

Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.460 grammes à sa naissance et 2.470 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 30/3.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie, le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXX (26 juillet 1908, obs. 1257).

R. L..., vingt-six ans, mécanicienne, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Deux accouchements normaux en 1903 et 1904. Premier enfant élevé au sein d'une nourrice et au biberon, vivants. Deuxième élevé au biberon, mort à (?).

Grossesse actuelle. Dernières règles du 25 au 26 décembre. Albumine pendant la grossesse, régime lacté, des traces d'albumine dans les urines au moment de l'accouchement. Rien aux poumons.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse.

Accouchement spontané au septième mois. Enfant pesant 1.720 grammes, mort peu après sa naissance. Placenta 650 grammes. Membranes 36/0.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie, le cinquième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXI (8 novembre 1908, obs. 1904).

H. M..., vingt et un ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Mère morte à trente-cinq ans de tuberculose pulmonaire.

Réglée à quatorze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à huit ans.

Premier accouchement normal en 1904. Deuxième accouchement normal en 1906 (Cl. Baudelocque, obs. 1135). Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 3.500 grammes à sa sortie le dixième jour. Placenta 650 grammes..

Suites de couches normales.

Les deux enfants soignés par des nourrices sont bien portants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 11 au 16 janvier. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance et 3.350 à sa sortie le sixième jour. Placenta 650 gr. Membranes 36/4.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXII (obs. 2.000, 24 novembre 1908).

B. M., trente-cinq ans, ménagère, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Sœur morte à trente-trois ans de tuberculose pulmonaire.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Scarlatine en 1898. Pleurésie en 1906 (mois d'août).

Huit accouchements normaux (en octobre 1894, décembre 1896, novembre 1897, janvier 1902, juillet 1903, mars 1905, mai 1906, février 1907). Tous les enfants furent élevés au biberon. Cinq sont vivants, trois morts en bas âge d'entérite.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 31 janvier au 3 février. Rien aux poumons.

L'accouchement se termine par une application de forceps (souffrance de l'enfant). Bassin légèrement rétréci. Enfant pesant 3.300 grammes à sa naissance et 3.080 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 41/4.

Suites de couches. Etat de la femme à sa sortie le sixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXIII (2 décembre 1908, obs. 2048).

C. E..., quarante-six ans, journalière, VIII-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trente-deux ans en 1894, depuis cette époque bronchite tous les hivers. Pneumonie gauche en 1903, pneumonie droite en 1905, pneumonie gauche en 1906.

Cinq accouchements normaux (en 1886-1887-1890-1894-1897, 1902). La sixième grossesse se termine en 1906 par expulsion d'un enfant macéré neuf mois après ses dernières règles. Quatre enfants nourris au sein maternel vivants. Un enfant mort à la naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 20 au 2 avril. Varices et œdème considérables des membres inférieurs. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.400 grammes à sa naissance et 3.190 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 770 grammes. Membranes 24/14. Liquide amniotique 3 litres environ.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXXIV (7 décembre 1908, obs. 2071).

T. J..., vingt-neuf ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à quarante-deux ans d'affection pulmonaire.

Réglée à dix-sept ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-sept ans.

Accouchements normaux en 1899 et 1903. Les deux enfants vivants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 21 au 25 février. Rien aux poumons.

Accouchement spontané d'un enfant pesant 3.750 grammes à sa naissance et 3.800 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 550 grammes. Membranes 29/8.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CCXXV (10 décembre 1908, obs. 2126).

D. E..., quarante et un ans, journalière, XV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-sept ans.

Cette femme aurait eu quatorze grossesses dont cinq seulement seraient terminées par des accouchements à terme, quatre par des accouchements prématurés, et cinq par des avortements dans les cinq premiers mois. Deux enfants seulement sont encore vivants.

Grossesse actuelle : Dernières règles au 30 septembre. Evolution normale de la grossesse jusqu'au 9 décembre. A cette date, elle a une abondante hémorragie et expulse un embryon qu'elle apporte à la Clinique Baudelocque le 10 décembre. Sa température est alors de 37°4 et le pouls est à 96.

16 décembre. — On fait une extraction digitale des débris contenus dans la cavité utérine.

Les suites sont normales. Etat de la femme à sa sortie le quinzième jour, bon.

OBSERVATION CCXXVI (16 janvier 1909, obs. 95).

L. A..., trente-huit ans, mécanicienne, IX-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à quarante-deux ans d'affection pulmonaire.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à trente ans, en 1901. Sept accouchements normaux en 1888, 1890, 1893, 1895, 1897, 1900, 1906. En 1901 accouchement de deux jumeaux dont un mort né, l'autre mort à trois mois de (?). Tous les autres enfants élevés au biberon par la mère sont vivants.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 5 au 10 avril. Hémorragie dans le cours du huitième mois. Rien aux poumons. Hémorragie grave au début du travail nécessitant une rupture large des membranes.

Accouchement spontané. Enfant mort pesant 2.800 grammes. Placenta 480 grammes. Mensuration des membranes impossible. Insertion vicieuse du cordon.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXXVII (18 janvier 1909, obs. 109).

C. T..., trente ans, ménagère, V-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-neuf ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Rhumatisme articulaire. aigu en 1899. Pneumonie et pleurésie en 1904.

Quatre accouchements normaux(en 1899-1901-1994 et 1906)

Les enfants nourris au sein maternel sont tous vivants.

Grossesse actuelle. Dornières règles du 30 avril au 2 mai. Etat général de la femme assez bon. A l'auscultation du cœur, on trouve des signes d'insuffisance mitrale; aux poumons, signes d'une bronchite chronique. Température 37 degrés. Pouls 84.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.900 grammes à sa naissance et 3.050 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 31/8.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXXVIII (21 janvier 1909, obs. 124).

C. M..., trente-six ans, femme de ménage, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-cinq ans en 1898.

Quatre accouchements normaux en 1895, 1898, 1901, 1907. La cinquième grossesse se termine par expulsion au septième mois d'un fœtus mort. Tous les enfants ont été élevés au biberon. Le premier meurt à trois ans de rougeole; le deuxième meurt à sept mois de (?); le troisième est vivant; le quatrième meurt à trois ans de pleurésie.

Grossesse actuelle : dernières règles du 10 juin.

Pendant la grossesse de l'albumine dans les urines. La femme arrive à la clinique avec une température de 39 degrés et pouls à 108. Rien aux poumons.

Expulsion d'un fœtus macéré de 140 grammes. Placenta 280 grammes. Membranes 28/14.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXIX (21 janvier 1909, obs. 125).

L. G..., vingt-quatre ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans, régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-neuf ans.

Premier accouchement normal en 1907.

Enfant élevé au biberon, bien portant.

Grossesse actuelle : dernières règles du 5 au 8 avril. Rien aux poumons.

Accouchement normal.

Enfant pesant 3.780 grammes à sa naissance et 3.520 gr. à sa sortie le septième jour.

Placenta 550 grammes. Membranes 29/5.

Suites de couches : température de 38°5 les deux premiers jours. Le troisième jour, la température devient et reste normale jusqu'à la sortie de la femme le septième jour. Son état à la sortie est bon.

OBSERVATION CCXXX (4 avril 1909, obs. 595).

Femme R. B..., cuisinière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Père mort à cinquante-deux ans d'affection cardiaque. Une sœur morte à treize ans de tuberculose.

Réglée à seize ans irrégulièrement,

Antécédents personnels. — Rougeole dans l'enfance. Pleurésie à huit ans. Scarlatine à neuf ans.

Décembre 1903. — Expulsion d'un fœtus de six mois. Cause inconnue.

Grossesse actuelle : dernières règles, du 28 au 30 juin. Rien aux poumons.

Accouchement spontané. Enfant pesant 4.200 grammes à sa naissance et 4.040 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta de 710 grammes. Membranes, 31/13.

Suite de couches normales. Etat de la mère à sa sortie, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXXI (12 avril 1909, obs. 610).

Femme P. M..., vingt-neuf ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à dix-sept ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à dix-huit ans.

En 1903, avortement dans le cours du quatrième mois (cause?).

Grossesse actuelle. Dernières règles du 2 au 6 juillet.

Au moment de l'accouchement, traces d'albumine. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.120 grammes à sa naissance et 3.100 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta de 450 grammes. Membranes 28/6.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, bon.

OBSERVATION CCXXXII (16 avril 1909, obs. 632).

Femme W. J..., trente-deux ans, couturière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à douze ans irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Rougeole dès l'enfance Pleurésie et bronchite à dix-huit ans.

En 1900 premier accouchement normal. Enfant nourri au sein maternel huit mois, puis mis en nourrice, mort trois jours après son arrivée chez la nourrice.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 28 juin au 2 juillet. Rien aux poumons. Varices et œdème des membres inférieurs.

Accouchement spontané. Enfant pesant 4.400 grammes à sa naissance et 4.330 grammes à sa sortie le neuvième jour. Placenta 670 grammes. Membranes 35/0.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le neuvième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXXIII (22 avril 1909, obs. 670).

Femme R. E... , quarante ans, journalière, XVII-père.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à treize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — En 1894, pleurésie. En 1905, coliques hépatiques.

Cette femme est devenue seize fois enceinte. Ses grossesses se sont terminées douze fois par des accouchements normaux à terme ou près du terme et quatre fois par l'expulsion du fruit de conception dans le cours du troisième mois. Avant sa pleurésie, de 1887 à 1894, elle avait eu déjà six accouchements et deux avortements. Sur les six enfants, nés à terme ou près du terme, deux seulement sont vivants ; les autres sont morts en bas âge. Sur les huit grossesses survenues depuis 1894, nous relevons deux avortements. Des six enfants nés à terme ou près du terme, quatre sont vivants et bien portants. L'un des deux autres est mort à dix-huit mois dans une crèche, le deuxième à deux ans de fièvre typhoïde.

Grossesse actuelle. Dernières règles, du 28 juin au 5 juillet. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.080 grammes à sa naissance et 2.960 grammes le dixième jour. Placenta 475 gr. Membranes 29/3.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le dixième jour, satisfaisant.

OBSERVATION CCXXXIV (21 mai 1909, obs. 843).

Femme J. L.... vingt-huit ans, blanchisseuse, II-père.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quatorze ans, irrégulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à six ans.

Accouchement normale en 1905. Enfant nourri au sein maternel trois semaines, puis au biberon. Mort à trois mois en juillet d'entérite.

Grossesse actuelle: Dernières règles, 13-18 juillet. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.450 grammes à sa naissance, et 3.360 grammes à sa sortie le huitième jour. Placenta 520 grammes, Membranes 28/8.

Suites de couches normales. Etat de la mère à sa sortie le huitième jour, bon,

OBSERVATION CCXXXV (22 juin 1909, obs. 1037).

Femme C. L..., trente et un ans, couturière, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à seize ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à vingt-deux ans au mois de novembre 1900.

En septembre 1900, accouchement normal. Enfant nourri au sein maternel. Au mois de novembre la femme fait une pleurésie (temp. 40°). La sécrétion lactée diminue, l'enfant est mis au biberon et meurt six semaines après le sevrage. En décembre 1901 accouchement normal. Enfant nourri au sein maternel mort à cinq ans de diphtérie.

Grossesse actuelle : 15 au 20 septembre état général satisfaisant, aux poumons frottements pleuraux à la base gauche.

Accouchement normal. Enfant pesant 4.280 grammes à sa naissance et 4.070 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta 450 grammes. Membranes 32/4.

Suites de couches parfaites. Etat de la mère à sa sortie le septième jour, bon,

OBSERVATION CCXXXVI (Obs. 1088, 1^{er} juillet 1909).

A. M..., vingt-trois ans, femme de ménage, IV-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à douze ans et demi régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à neuf ans.

En décembre 1906 accouchement dans le cours du huitième mois (Baudelocque, obs. 2015). Enfant pesant 2.210 grammes à sa naissance, mort quelques heures après. Placenta 390 gr. Membranes 30/8.

Suites de couches normales. La femme sort le septième jour en bon état général.

En juin 1907, avortement dans le cours du deuxième mois. Enfant mort deux jours après sa naissance.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 4 au 8 octobre.

La femme ne s'est pas reposée pendant toute la durée de sa grossesse. Rien aux poumons.

Accouchement normal au neuvième mois. Enfant pesant 2.170 grammes à sa naissance et 1.980 grammes à sa sortie le septième jour. Placenta 420 grammes. Membranes 24/7. Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le huitième jour, bon.

OBSERVATION CCXXXVII (29 août 1909, obs. 1406).

B. G..., vingt ans, infirmière, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie à six ans.

Juillet 1907. — Premier accouchement (Baudelocque, obs. 1072). Siège décomplété, mode des fesses. Enfant pesant 3.250 grammes, mort pendant l'extraction. Placenta 500 gr. Suites de couches normales.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 18 au 21 novembre. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 3.950 grammes à sa naissance, et 3.840 grammes à sa sortie le onzième jour. Placenta 500 grammes. Membranes 35/0.

Suites de couches normales. Etat de la femme à sa sortie le onzième jour, bon.

OBSERVATION CCXXXVIII (août 1909, obs. 1411).

Femme P. M..., vingt-trois ans, ménagère, III-pare.

Antécédents héréditaires. — Rien à noter.

Réglée à quinze ans régulièrement.

Antécédents personnels. — Pleurésie 1902.

Premier accouchement, décembre 1904 (Baudelocque, obs. 1724).

Accouchement normal. Enfant pesant 3.650 grammes. Placenta 600 grammes. Dans les suites de couches, la température s'élève le quatrième jour à 39°3, mais retombe le lendemain à la normale après une injection intra-utérine. L'état général de la mère à la sortie, le quatorzième jour, est excellent.

L'enfant, qui à son départ pèse 3.650 grammes, est mis en nourrice et meurt à huit mois d'entérite au mois d'août.

Deuxième accouchement, mars 1907 (Baudelocque, obs. 424).

Accouchement normal. L'enfant pèse 2.750 grammes. Placenta 390 grammes.

Suites de couches normales. Etat de la mère à la sortie satisfaisant le septième jour. L'enfant qui à sa sortie pèse 2.720 gr. est nourri au sein maternel pendant dix-neuf mois et bien portant.

Grossesse actuelle. Dernières règles du 20 au 23 octobre. Rien aux poumons.

Accouchement normal. Enfant pesant 2.770 grammes à sa naissance et 2.580 grammes à sa sortie le sixième jour. Placenta 400 grammes. Membranes 33/4.

Suites de couches normales. La femme sort de la clinique le sixième jour en parfait état.

OBSERVATION CCXXXIX (Obs. 619, 12 avril 1910).

M. M..., vingt-cinq ans, domestique, II-pare.

Antécédents héréditaires. — Un frère mort à dix-neuf ans d'affection pulmonaire.

Réglée à onze ans et demi.

Antécédents personnels. — Pleurésie droite au mois de novembre dernier, soignée à l'hôpital d'Orléans, ponctionnée (?).

— Premier accouchement normal en 1903. Enfant vivant.

Grossesse actuelle : Dernières règles du 3 au 7 juillet. Etat général de la femme, bon. Pouls 84, température 36° 5. A l'auscultation des poumons on trouve submatité en arrière sur toute l'étendue du poumon droit. Aux deux sommets en arrière, submatité et respiration rude.

Accouchement normal. Enfant de 3.570 grammes. Placenta de 620 grammes.

Suites de couches normales.

CONCLUSIONS

D'après les 239 observations que nous avons recueillies dans les *Archives de la Clinique Baudelocque*, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

1° Une femme ayant eu, soit avant, soit après la puberté, une pleurésie, peut parfaitement mener à terme une ou plusieurs grossesses, sans qu'il en résulte rien de fâcheux pour elle, même si ses antécédents héréditaires sont entachés de tuberculose.

2 Il n'est pas fréquent de voir une femme qui a eu une pleurésie présenter des lésions tuberculeuses des poumons pendant la gestation ou après l'accouchement.

3° Les enfants issus de ces femmes ne présentent d'infériorité, ni au point de vue de leur poids initial, ni au point de vue de leur coefficient de résistance.

Vu : Le Président de la thèse

PINARD

Vu : le Doyen

LANDOUZY

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris

LIARD

